

# Hablemos Acerca De...

## Analgesia controlada por el paciente (PCA)

La analgesia controlada por el paciente, o PCA (por sus siglas en inglés), es una forma de que su niño controle su propio medicamento para el dolor. Analgesia significa "alivio del color."

Su niño puede necesitar PCA después de la cirugía o para un dolor causado por una enfermedad o una lesión. Un equipo de servicio para el dolor decidirá qué tipo de medicamento y dosis necesita. Este equipo incluye un anestesiólogo, o médico que proporciona medicamento durante la cirugía, y una enfermera. Ellos vigilarán a su niño y ajustarán sus medicamentos según sea necesario.

### ¿Cómo recibe mi niño el medicamento?

Su niño recibe el medicamento para el dolor a través de un tubo diminuto dentro de la vena llamada vía intravenosa, que con frecuencia se inserta en la parte posterior de la mano. Puede que ya tenga una vía intravenosa de la cirugía.


Para recibir el medicamento, su niño pulsa un botón conectado a una bomba. La computadora sonará y luego administrará el medicamento para el dolor a través de la vía intravenosa.

### ¿Puede mi niño recibir demasiada cantidad medicamento?

Es poco probable que su niño reciba demasiado medicamento. El médico ordenará la cantidad de medicamento para el dolor para su niño, y la enfermera programará la bomba para que él obtenga el medicamento correctamente.

Si su niño pulsa el botón demasiado pronto después de la última dosis, la bomba no responderá con un sonido y no le dará el medicamento a su niño.

Sin importar con qué frecuencia su niño pulse el botón, solo obtendrá la cantidad de medicamento ordenado por su médico. Solo su niño o su enfermera deben pulsar el botón.



### ¿Cuáles son los efectos secundarios de una PCA?

Los efectos secundarios comunes de una PCA pueden incluir:

- Somnolencia
- Náuseas
- Vómitos
- Picazón

La enfermera de su niño lo vigilará de cerca para asegurar que no esté demasiado somnoliento. Si la respiración de su niño es diferente o usted observa otros efectos secundarios, dígaselo a su enfermera. Su niño puede tomar otro medicamento si tiene efectos secundarios graves.

