Hablemos
Acerca De...

Emergencias del catéter central venoso

Existen algunas emergencias comunes del catéter central venoso. Este folleto le ayudará a atender dichas emergencias. Usted o su hijo siempre deben tener una pinza a la mano para casos de emergencia con el catéter. El personal de enfermería puede facilitarle una en el hospital. Asegúrese de tener siempre un "bolso de viaje" con usted. Éste contiene los artículos necesarios para atender las emergencias del catéter.

¿Qué debo hacer si aparece un orificio en el catéter o si se rompe?

1. Cierre inmediatamente el catéter con la pinza entre el orificio y su hijo. Si no puede encontrar la pinza rápidamente, doble el catéter con sus dedos.
2. Si tiene una gasa esterilizada a la mano, colóquela alrededor del extremo expuesto del catéter. Esto puede ayudar a evitar que entren microbios al catéter.
3. Llame a la compañía que le presta el servicio de salud en casa y describa la situación al personal de enfermería en turno. Pida una visita inmediata de enfermería domiciliaria para reparar el catéter o acuda directamente a la sala de urgencias.
4. Informe a su proveedor de cuidados de la salud.
5. Si la compañía que le presta el servicio de salud en casa no puede reparar el catéter, acuda a la sala de urgencias.

¿Qué debo hacer si el catéter se sale?

1. Presione directamente sobre la parte de la piel por donde se salió el catéter del cuerpo. Ejerza presión con la mano usando una gasa o toalla limpia durante 5 minutos.
2. Cuando se detenga la hemorragia:
   - Informe al médico de su hijo.
   - En el caso del área por donde se salió el catéter:
     - — Limpie con un hisopo Chloraprep® o Betadine®.
     - — Aplique un ungüento antibiótico.
     - — Cubra el área con un vendaje esterilizado hasta que el médico pueda ver al niño.
3. Si la hemorragia continúa después de 5 minutos, acuda a la sala de urgencias más cercana o llame al 911. Continúe ejerciendo presión directa en el área por donde se salió el catéter.

¿Qué debo hacer si no puedo purgar (enjuagar) el catéter?

1. Asegúrese de que el catéter no esté cerrado con la pinza ni doblado. Retire las pinzas y desdoble el tubo.
2. Si el catéter no está doblado, retire el vendaje y mire si está doblado u obstruido por debajo del vendaje.
3. Cambie el vendaje si le han enseñado cómo hacerlo.
4. Cambie las tapas si le han enseñado cómo hacerlo.

5. Si usted ha intentado todo lo anterior y aun así no consigue extraer líquido y purgar el catéter, llame inmediatamente a la compañía que le presta el servicio de salud en casa de su hijo.

Intermountain Primary Children's Medical Center
The Child First and Always®

© 2011 Intermountain Healthcare, Primary Children's Medical Center. Toda la información contenida en las series ***Hablemos Acerca de . . .*** tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de cuidados de la salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Pediatric Education Services, 801.662.3500 | Translation 10/11, LTA520408045 | Central line catheter emergencies (10/11)