Hablemos
Acerca De…

La celulitis

La celulitis es una infección del tejido debajo de la piel. Los signos de celulitis ocurren en cualquier parte del cuerpo, y se presentan como hinchazón, enrojecimiento, sensibilidad y piel caliente al tacto. Los niños también pueden tener fiebre y escalofríos. Los niños con celulitis en la cara o cerca de alguna articulación (coyuntura) generalmente deben ir al hospital para recibir tratamiento.

La infección es causada por bacterias que pueden haber entrado al cuerpo a través de una herida o una incisión quirúrgica. Las bacterias también pueden haber pasado a través de la sangre desde otro foco de infección como una infección de oído. Los niños con varicela tienen un mayor riesgo de contraer celulitis.

La celulitis debe tratarse inmediatamente. Si no se trata, la infección puede propagarse a la sangre, los huesos u otros órganos.

¿Cómo se previene la celulitis?

Mantenga las heridas limpias y secas, y lávese bien las manos. Los niños de un año de edad o mayores, deben recibir la vacuna contra la varicela para prevenir contraerla.

¿Cómo se trata la celulitis?

- Se pueden dar antibióticos ya sea en forma oral o a través de un pequeño tubo insertado en una vena (intravenosa).
- En caso de fiebre u otras molestias, puede darle al niño acetaminofeno (Tylenol®) o ibuprofeno (Advil®). No se debe dar aspirina a niños que tengan varicela y celulitis (ver la nota al final del folleto).
- Tal vez sea necesario hacer una incisión quirúrgica para drenar la infección.
- Es posible que se extraigan muestras de sangre para determinar la bacteria que está causando la infección.
- Algunas veces se extrae líquido de la zona infectada con una aguja para averiguar qué antibióticos se deben usar.
- También se pueden tomar radiografías para determinar si la infección se propagó a los huesos.

La duración del tratamiento y la estadía del niño en el hospital dependen de qué tan seria es la infección. Los niños con celulitis pueden permanecer en el hospital hasta por 10 días. A los niños generalmente se les permite comer una dieta regular y participar en actividades normales que no les causen molestias.

Nota: Puede usar acetaminofeno (Tylenol®) para temperaturas arriba de 101° F (38 ° C). No se debe dar aspirina a niños que tengan varicela, ya que les puede causar una enfermedad del cerebro, hígado y riñones llamada síndrome de Reye.

Lea las etiquetas de todas las medicinas, incluidas las marcas como Alka Seltzer®, para asegurarse de que no contengan cantidades pequeñas de aspirina. El ibuprofeno está aprobado para niños de 6 meses de edad o mayores, pero nunca se debe dar a niños que están deshidratados o vomitando continuamente.

Intermountain
Primary Children's
Medical Center
Healing for life℠

Pediatric Education Services
801.662.3500 Rev. 05/08
© Primary Children's Medical Center 2008
Cellulitis
ST-11/08

Toda la información contenida en las series ***Hablemos Acerca de…*** tiene solamente un propósito educativo. Esta informatción educacional no sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud puenden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.