Hablemos
Acerca De…

Alergia al látex

Muchas personas son alérgicas a un material de caucho llamado látex (lá-tex). El látex se deriva de la savia del árbol de caucho. Estamos rodeados de productos fabricados con látex. Utilizamos el látex para fabricar el caucho. Podemos encontrarlo en juguetes, prendas de vestir, llantas, bandas y guantes de caucho y en muchas otros artículos. El látex contiene proteínas las cuales causan alergias en algunas personas. Estas personas frecuentemente trabajan en el área de salud, los cuales utilizan elementos fabricados con látex todo el tiempo. Los niños que reciben cuidado médico intensivo también pueden desarrollar alergia al látex. Durante los procedimientos y cuidados médicos, ellos también entran en contacto con el látex.

¿Cuáles son los síntomas de la alergia al látex?

- Piel enrojecida o enronchada después de tener contacto con el caucho.
- Comezón o labios hinchados después de ir al dentista.
- Ojos llorosos o con comezón después de tener contacto con el caucho.
- Dolor o sensación de tener el pecho aprisionado.
- Dificultad para respirar.
- Cualquiera de estos signos después de jugar con globos.

Si Usted nota alguno de estos síntomas, llame a su proveedor de salud inmediatamente.

¿Puede mi hijo desarrollar alergia al látex?

Algunos niños pueden ser más propensos que otros a desarrollar alergia al látex. Estos niños tienden a reunir una o más de las siguientes características:

- Múltiples cirugías desde el nacimiento
- Espina bífida
- Defectos congénitos del sistema genito-urinario (vejiga, riñones, uréter, etc...)
- Alergias a ciertos alimentos, especialmente al plátano, kiwi, tomate, durazno y cereza.

Si su hijo presenta alguna de estas características, es muy importante que evite los productos de caucho. Pero esto también se aplica aun si su hijo nunca ha sufrido de las características mencionadas anteriormente. Mantenerlo alejado del contacto con el caucho ayudará a su hijo a evitar que desarrolle la alergia.

¿Qué sucede si mi hijo es alérgico?

No existe cura para ningún tipo de alergia. Lo mejor que puede hacer es evitar que su hijo entre en contacto con productos de látex.

- Mantenga al niño alejado del látex. Por ejemplo, use globos fabricados con “Mylar” en vez de globos de látex (pregunte en el centro de información del “Primary Children’s” cuales son las diferencias entre un globo y otro). Utilice guantes de vinilo o plásticos en lugar de guantes de caucho. Provea juguetes de plástico o de vinilo.
- Informe a todos los trabajadores del área de cuidado de la salud sobre la alergia de su hijo. Asegúrese de que la alergia de su hijo esté registrada en su historia médica. En este caso, el hospital debe utilizar productos que no contengan látex. Por ejemplo, deben utilizar catéteres plásticos y cinta quirúrgica de seda.
- Evite utilizar catéteres urinarios de látex y los catéteres rojos de caucho que se emplean para irrigar o para los tubos de enemas.
- Hable con su médico o enfermera acerca de la pulsera de ALERTA-MEDICA (MEDIC-ALERT, en inglés) para su hijo.
- Hable con su médico o enfermera acerca de la medicina que puede tener en casa, en caso de que su hijo la necesite. La medicina viene en una jeringa, lista para que se la inyecte a su hijo. Asegúrese de que la jeringa no contenga látex.

¿Mi hijo debe realizarse alguna prueba de alergia?

Usted puede pedir que le hagan una prueba de alergia a su hijo para determinar si es alérgico al látex. Hable con su proveedor de salud si desea que le realicen esta prueba.

Intermountain
Primary Children's
Medical Center
Healing for life℠

Pediatric Education Services
801.662.3500 Rev. 03/07
© Primary Children's Medical Center 2007
Latex Allergies
ST-12/07

Toda la información contenida en las series ***Hablemos Acerca de…*** tiene solamente un propósito educativo. Esta informatción educacional no sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.