Intermountain® Healthcare

17P para la prevención de partos prematuros

¿Qué es 17P?

La abreviatura "17P" significa caproato 17 de alfa hidroxiprogesterona. Es un tipo de progesterona, una hormona producida naturalmente por la placenta durante el embarazo. El medicamento 17P es recetado por el médico para ayudar a prevenir el parto prematuro.

¿Por qué se me ofreció este tratamiento?

Su médico o partera pueden recomendarle 17P si usted presenta estas dos condiciones:

- Usted sólo esta teniendo un bebé en este embarazo (es decir, se trata de un embarazo único, no de mellizos, trillizos o embarazo múltiple).

  Y
- Ya ha tenido al menos un parto prematuro de embarazo único.

Los estudios demuestran que el tratamiento 17P en el segundo trimestre del embarazo puede disminuir el riesgo de un parto prematuro para las mujeres que concuerdan con este perfil de alto riesgo. En un estudio publicado recientemente, la tasa de partos prematuros se redujo a un tercio entre estas mujeres. Sin embargo, otras mujeres embarazadas pueden no necesitar o beneficiarse de tomar este medicamento.

¿Es seguro el 17P?

Los expertos consideran que el 17P es seguro para las madres y los bebés cuando se administra en el segundo y tercer trimestres del embarazo. De hecho, el principal grupo nacional de expertos en embarazos, el Consejo Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG), aprueba y recomienda el uso de 17P para prevenir el parto prematuro recurrente. Los estudios de seguimiento en los niños nacidos de madres tratadas con 17OHP no mostraron efectos adversos del tratamiento.

El parto prematuro significa un nacimiento antes de las 37 semanas de embarazo. El parto prematuro es peligroso para la salud del bebé.

¿Por qué es tan importante prevenir el parto prematuro?

Un bebé nacido demasiado pronto (recién nacido prematuro, denominado generalmente "bebé prematuro") será más pequeño de lo normal y puede tener órganos subdesarrollados. Esto puede ocasionar problemas con la respiración y la alimentación, y hace que el bebé más vulnerable a las infecciones, los problemas cerebrales y otras complicaciones graves. Un bebé prematuro enfermo o muy pequeño puede padecer problemas de aprendizaje o problemas físicos a lo largo de la vida o, a pesar de la mejor atención médica, puede morir.

A pesar de estos riesgos, muchos bebés prematuros prosperan. Cuanto más cerca sea el nacimiento a la fecha de parto, el bebé prematuro tendrá mejores posibilidades de gozar buena salud en el nacimiento y a lo largo de la vida. Aún así, un bebé prematuro casi siempre requiere de atención médica avanzada en una unidad de cuidados intensivos para recién nacidos (NICU). Combinado con un dolores de parto prematuro inesperados, esto resulta en un comienzo estresante para la nueva vida.

¿Cómo se administra el 17P?

- El medicamento 17P se administra en una inyección semanal (vacuna).
- Generalmente, las inyecciones semanales comienzan en la semana 16 ó 20 del embarazo (aunque tambien pueden comenzar más tarde). Estas inyecciones deberán continuar hasta la semana 36 de embarazo.
- Cada inyección se debe aplicar en un músculo. La mayoría de las mujeres eligen que les apliquen la inyección en el músculo del trasero o en el músculo del muslo.
- Usted puede obtener su inyección semanal en el consultorio de su médico o en su hogar. (En su hogar, puede inyectarse usted misma o que alguien lo haga por usted). Infórmele a su médico dónde desea recibir sus inyecciones.

¿Tendré efectos secundarios por el 17P?

La mayoría de las mujeres no informaron tener efectos secundarios, aparte de leve dolor e hinchazón en el lugar de la inyección. Si padece dolor, puede aliviarlo sentándose en una tina con agua tibia o tomando acetaminofén (Tylenol). No tome ningún otro medicamento sin antes consultar con su médico.

¿Cuándo debería llamar al médico?

Al igual que cualquier mujer embarazada, usted debería llamar a su médico o partera si tiene alguno de estos síntomas:

- Contracciones (no siempre dolorosas), que se producen cada 15 minutos o más seguido
- Calambres (como los calambres menstruales) constantes o esporádicos, que pueden presentarse con diarrea
- Dolor de espalda suave o débil, que es constante o esporádico
- Presión en su pelvis, ingle o muslos
- Sangrado o manchado
- Cambio en el flujo vaginal (un aumento repentino del flujo o flujo que se vuelve repentinamente acuoso o con mucosidad)
- Una efusión o goteo lento de líquido de su vagina
- Sensación de que su útero está “anudado” o “apretado”, o que el bebé se está haciendo bolita adentro
- Dolores de cabeza que son severos o constantes
- Hinchazón repentina de su rostro o manos
- Dolor en la parte superior derecha de su vientre
- Visión borrosa o manchas delante de sus ojos
- Aumento repentino de peso (más de una libra en un día)
- Disminución o falta total de movimiento de su bebé
- Sensación de que algo no está bien

Nombre del medicamento: 17P (caproato 17 de alfa hidroxiprogesterona)

Cuándo tomarla (escribir fechas):

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Instrucciones para las inyecciones (si se coloca las inyecciones en su hogar):

Cantidad a inyectar: _____ lugar(es) a inyectar: _____

Otras instrucciones: _____

Si se me olvida una inyección: _____

Si tengo preguntas acerca de este medicamento, puedo llamar a: nombre: _____ teléfono: _____

© 2008 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de cuidados de la salud. Hay más información disponible en **intermountainhealthcare.org.** **Patient and Provider Publications 801.442.2963 FS070S - 10/08** (Spanish translation 10/08 by Lingotek, Inc.)