

# Hablemos Acerca De...

## Mandíbula, cerclaje

El cerclaje de la mandíbula, también es conocido como fijación maxilomandibular o MMF (por sus siglas en inglés), es un procedimiento en el cual se unen los huesos de la mandíbula con alambre.

### ¿Por qué mi niño necesita tener la mandíbula cerrada con cerclaje?

Su niño puede necesitar tener la mandíbula cerrada con cerclaje si:

- Tiene problemas con la mandíbula que necesitan arreglarse
- Los huesos de la mandíbula no están alineados correctamente
- Se lesionó la mandíbula en un accidente

### ¿Qué pasa cuando mi niño tiene la mandíbula cerrada con cerclaje?

Para unir los huesos de la mandíbula de su niño con cerclaje:

- El cirujano oral une barras de arco a las encías superiores e inferiores. Las barras de arco se extienden desde la muela de atrás de un lado y da la vuelta hasta la parte posterior de la muela del otro lado.
- El cirujano luego conecta alambres delgados o elásticos desde la barra de arco superior a la barra de arco inferior. Por lo general, hay dos alambres o elásticos en la parte posterior cerca de los muelas posteriores y dos en la parte del frente. Esto mantiene la mandíbula cerrada.

Los niños pequeños no pueden tener barras porque sus dientes no son lo suficientemente fuertes. El cirujano puede colocar alambres o elásticos separados alrededor del maxilar superior y la mandíbula inferior. Estos se aseguran el uno al otro para cerrar la mandíbula. Este procedimiento se llama fijación circummandibular con alambres.

### ¿Qué puedo esperar después de que la mandíbula de mi niño esté cerrada con cerclaje?

Su niño puede tener la mandíbula superior e inferior adormecida durante 1 a 2 meses después de la cirugía. Puede babear debido a este entumecimiento. Tenga a mano un paño suave para limpiar el exceso de saliva que provenga de la boca de su niño.



### ¿Cómo cuido la boca de mi niño?

Es importante crear una rutina diaria al cuidar la boca de su niño. Una rutina diaria incluye:

- Ayudar a su niño a cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día. Las encías pueden estar sensibles, así que un cepillo de dientes suave puede ayudar.
- Asegúrese que su niño se limpie la boca por lo menos dos veces al día. Puede sacudir y escupir agua salada (solución salina normal) o usar el enjuague bucal recetado por el cirujano.
- Mantenga hidratados los labios de su niño usando bálsamo labial.
- Revise el interior de la boca de su niño todos los días para asegurarse de que no haya algún problema con los alambres o infecciones.
- Use cera dental (la puede encontrar en las farmacias o consultorios dentales) para cubrir las puntas afiladas de los alambres y evitar que se formen llagas dentro de la boca de su niño. Cuando la cera desaparezca, necesita reponerla.

No utilice esponjas en la boca de su niño. La esponja se puede atorar en los alambres.

