

Hablemos Acerca De...

Disminución progresiva de la dosis de opiodes en casa

Los opiodes son medicamentos fuertes que tratan el dolor y las molestias. Lamentablemente también generan algunas dependencias fuertes. La mejor forma de retirar el analgésico a su niño es disminuyendo gradualmente la dosis de opioide. Esto es una reducción lenta del medicamento de su niño que se puede administrar por vía oral o i.v. (tubo pequeño que se coloca en una vena).

¿Qué es la disminución progresiva de la dosis de opiodes?

Durante la disminución progresiva de la dosis de opiodes, usted disminuye lentamente la dosis de opioide de su niño y a veces, aumenta el tiempo entre las dosis. La disminución progresiva de la dosis evita el dolor y las molestias del síndrome de abstinencia.

Su niño puede presentar el síndrome de abstinencia de opiodes cuando usa opiodes regularmente durante 5 días y deja de tomar el medicamento de manera abrupta.

¿Por qué es necesario disminuir progresivamente la dosis de opioide a mi niño?

Mientras su niño está hospitalizado necesitaba determinados medicamentos para tratar o prevenir el dolor. Es posible que su niño necesite disminuir gradualmente la dosis de opioide. La disminución progresiva de la dosis de opiodes evitará el dolor, la irritación y el estrés que pueden presentarse al dejar de tomar este medicamento demasiado rápido.

¿Cuánto tiempo estará mi niño bajando la dosis de opioide progresivamente?

La disminución progresiva de la dosis de opiodes de su niño puede durar tan solo unos días o hasta 2-3 semanas. El proveedor de atención médica de su niño

se asegurará de que este proceso de disminución progresiva de la dosis de opiodes sea seguro y eficaz para su niño. Ellos pueden decirle cuánto tiempo prevén que durará el proceso de disminución progresiva de la dosis de opiodes en su niño.

¿Cómo mantengo a mi niño seguro durante el proceso de disminución progresiva de la dosis de opiodes?

El médico de su niño proporcionará dosis seguras y eficaces de opiodes a su niño. Lo siguiente ayudará a evitar problemas mientras su niño está en el proceso de disminución progresiva de la dosis de opiodes:

- Administre a su niño el medicamento exactamente tal como le ha recetado el proveedor de atención médica.
- No comparta el medicamento con nadie más.
- No cambie la cantidad de medicamento que recibe su niño salvo que el proveedor de atención médica de su niño le haya dado instrucciones específicas.
- No cambie el horario en que su niño recibe el medicamento salvo que el proveedor de atención médica de su niño le haya dado instrucciones específicas.



