

Consulte el paquete del medicamento para las instrucciones y advertencias completas, y siempre siga las instrucciones de su pediatra. Tomar demasiado acetaminofeno puede causar problemas.

Llame a su pediatra de inmediato si un niño menor de 3 meses de edad tiene una fiebre de 100.4°F (38°C) o más alta (a menos que su niño haya recibido sus vacunas hoy).

Siga estas recomendaciones para darle la dosis correcta de acetaminofeno a su niño:

- **Utilice el peso de su niño para elegir la dosis correcta.**
- **No le dé acetaminofeno por más de 7 días seguidos** sin consultar a su pediatra.
- Usted puede darle la dosis indicada en la gráfica a continuación cada 4 horas, si es necesario. Dele la mínima cantidad de la dosis necesaria para ayudar a que su niño se sienta mejor. **No le dé más de 5 dosis en 24 horas.**
- El acetaminofeno se encuentra en varios analgésicos de venta libre y recetados. Lea las etiquetas, y **no le dé a su niño más de un medicamento que contenga acetaminofeno** sin consultarlo con su médico.

**Nota:** El acetaminofeno líquido solía estar disponible en diferentes concentraciones. Esta guía es para la concentración de **160 mg por 5 mL** concentración. Si usted tiene una concentración diferente, siga las instrucciones del fabricante o las de su pediatra.



### Acetaminofeno (Tylenol) Guía de Dosificación

Peso (en libras)	Dosis	Jarabe líquido para bebés (use la jeringa incluida)	Jarabe líquido para niños (use la cuchara incluida)	Tabletas masticables o desbaratables para niños	Tabletas masticables o fundibles de fuerza para niños
<b>Concentración</b>		<b>de 160 mg/5 mL</b>	<b>de 160 mg/5 mL</b>	<b>80 mg</b>	<b>160 mg</b>
9–12 lbs	<b>40 mg</b>	1.25 mL			
13–16 lbs	<b>60 mg</b>	1.875 mL			
17–26 lbs	<b>80 mg</b>	2.5 mL	2.5 mL (½ cucharadita)		
27–34 lbs	<b>120 mg</b>	3.75 mL	3.75 mL (¾ cucharadita)		
35–52 lbs	<b>160 mg</b>	5.0 mL	5.0 mL (1 cucharadita)	2 tabletas	
53–69 lbs	<b>240 mg</b>		7.5 mL (1½ cucharaditas)	3 tabletas	
70–87 lbs	<b>320 mg</b>		10 mL (2 cucharaditas)	4 tabletas	2 tabletas
88–105 lbs	<b>400 mg</b>		12.5 mL (2½ cucharaditas)	5 tabletas	2½ tabletas
106+ lbs	<b>480 mg</b>		15 mL (3 cucharaditas)	6 tabletas	3 tabletas

Consulte el paquete del medicamento para las instrucciones y advertencias completas, y siempre siga las instrucciones de su pediatra. Tomar demasiado ibuprofeno puede causar problemas.

Llame a su pediatra de inmediato si un niño menor de 3 meses de edad tiene una fiebre de 100.4°F (38°C) o más alta.

No le dé ibuprofeno a su niño si va a tener una cirugía dentro de una semana. Puede aumentarle ligeramente el riesgo de sangrado.

Siga estas recomendaciones para darle a su niño la dosis correcta de ibuprofeno:

- Revise el frasco para determinar cual concentración tiene. El ibuprofeno líquido está disponible en concentraciones diferentes.
- Utilice el peso de su niño para elegir la dosis correcta.



- **No le dé ibuprofeno por más de 7 días** seguidos sin consultarlo con su pediatra.
- **No les dé ibuprofeno a niños menores de 6 meses.**
- **Le puede dar la dosis indicada en la gráfica a continuación cada 6 horas, si es necesario.** Dele las dosis mínimas necesarias para ayudar a que su niño se sienta mejor. **No le dé más de 5 dosis en 24 horas.**
- **Dele la menor cantidad de medicamento necesario para ayudar a que su niño se sienta mejor.** La mitad de la dosis recomendada puede ser efectiva.

### Ibuprofeno (Motrin, Advil) Guía de dosificación

Peso (en libras)	Dosis (hasta)	Gotas para niños (use el gotero incluido)	Líquido infantil (use la jeringa o cuchara incluida)	Tabletas masticables	Masticables para niños	Tabletas fáciles de tragar para niños	Tabletas para adultos
Concentración		de 50 mg/1.25 mL	de 100 mg/5 mL	50 mg	100 mg	100 mg	200 mg
11–16 lbs	<b>50 mg</b>	1.25 mL (1 gotero ó 2/3 jeringa)	2.5 mL (1/2 cucharadita)				
17–21 lbs	<b>75 mg</b>	1.875 mL	3.75 mL (3/4 cucharadita)				
22–32 lbs	<b>100 mg</b>		5.0 mL (1 cucharadita)	2 tabletas	1 tableta		
33–43 lbs	<b>150 mg</b>		7.5 mL (1 1/2 cucharaditas)	3 tabletas	1 1/2 tabletas		
44–54 lbs	<b>200 mg</b>		10 mL (2 cucharaditas)	4 tabletas	2 tabletas	2 tabletas	
55–65 lbs	<b>250 mg</b>		12.5 mL (2 1/2 cucharaditas)	5 tabletas	2 1/2 tabletas	2 1/2 tabletas	1 tableta
66–87 lbs	<b>300 mg</b>		15 mL (3 cucharaditas)	6 tabletas	3 tabletas	3 tabletas	1–1 1/2 tabletas
88+ lbs	<b>400 mg</b>		17.5 mL (4 cucharaditas)	8 tabletas	4 tabletas	4 tabletas	2 tabletas

Pediatric Dosing Guide