

# Cirugía de injerto de piel

## ¿Qué es un injerto de piel?

Un injerto de piel es una cirugía para reparar la piel. Usted podría necesitar un injerto de piel para:

- Tratar una quemadura grave
- Ayudar a su piel a sanar después de retirar la piel durante la cirugía, por ejemplo, durante el cáncer de piel o la cirugía plástica (reconstructiva)
- Reparar una zona de pérdida de piel por un traumatismo, enfermedad u otra afección médica

## ¿Qué ocurre durante la cirugía?

- En la mayoría de los casos, a usted le pondrán anestesia para dormirlo.
- Se obtiene un pedazo de piel saludable (el “injerto”) de un lugar del cuerpo llamado el “sitio donante”.
- El injerto se extiende sobre el área que es necesario reparar. Se fija en su lugar con grapas o puntos de sutura y vendajes (vendas).
- Usted posiblemente se marchará a casa el mismo día de la cirugía. Sin embargo, según su cirugía, es posible que deba permanecer algunos días en el hospital para que el médico y el personal puedan asegurarse de que usted está sanando bien antes de marcharse a casa. Consulte con su médico.

### Mi cita de seguimiento

Date/Time: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Doctor: \_\_\_\_\_

## ¿Cuándo debería llamar a mi médico?

Llame a su médico de inmediato si usted tiene:

- Sangre de color rojo brillante, pus o un olor fétido en el injerto o en el sitio donante
- Dificultad para respirar
- Una temperatura de 101°F (38°C)
- Escalofríos que duran más de 12 horas
- Náuseas sin control
- Vómitos que no cesan
- Dolor que no mejora

## ¿Cuáles son los riesgos?

Cualquier cirugía conlleva determinados riesgos. Algunos **riesgos comunes** incluyen:

- Dolor
- Sangrado, infección e hinchazón
- Daños en los nervios
- Fracaso del injerto
- Superficie de la piel desigual
- Decoloración de la piel
- Cicatrices
- Náuseas y vómitos a causa de los analgésicos

Algunos **riesgos no comunes** incluyen:

- Tener dolor crónico y sensibilidad en el sitio del injerto (raras veces)
- Movimiento limitado en el sitio del injerto (raras veces)

