

Efectos secundarios de los medicamentos para el corazón

todos los medicamentos pueden producir reacciones alérgicas.

Busque atención médica inmediatamente si:

- Tiene dificultad para respirar
- Tiene sarpullido o urticaria
- Tiene alguno de los efectos secundarios graves mencionados abajo.

Tipo de medicamento	Nombre del medicamento genérico (Marca)	Para qué se usa	Efectos secundarios comunes	Efectos secundarios graves (Comuníquese con un médico inmediatamente)
Betabloqueadores	<ul style="list-style-type: none"> • carvedilol (Coreg) • Metoprolol (Lopressor) • metoprolol XL (Toprol XL) 	Disminuye la presión arterial y el ritmo cardíaco; reduce la remodelación cardíaca debida a insuficiencia cardíaca	Mareos, fatiga, disminución de la presión arterial	Sarpullido extenso, asma (raro)
ARB/IECA	<ul style="list-style-type: none"> • enalapril (Vasotec) • lisinopril (Prinivil/Zestril) • ramipril (Altace) • losartán (Cozaar) • valsartán (Diovan) 	Disminuye la presión arterial; reduce la remodelación cardíaca debida a insuficiencia cardíaca	Tos seca, mareos, dolor de cabeza, disminución de la presión arterial	Hinchazón de la lengua o los labios
CCB (Calcium Channel Blocker)	<ul style="list-style-type: none"> • amlodipina (Norvasc) • nifedipina (Procardia) • nicardipina (Cardene) 	Disminuye la presión arterial; disminuye cambios en el corazón debido a insuficiencia cardíaca	Mareos, hinchazón de los brazos o las piernas (edema), dolor de cabeza, enrojecimiento de la piel (sofoco)	Perdida del conocimiento, latidos del corazón que no parecen normales
Agentes antiplaquetarios	<ul style="list-style-type: none"> • aspirina • clopidogrel (Plavix) • prasugrel (Effient) • ticagrelor (Brilinta)* 	Evita la formación de coágulos y la obstrucción del stent	Sangrado menor, dolor de cabeza, moretones *Falta de aliento	Sarpullido extenso, sangrado profuso
Estatina	<ul style="list-style-type: none"> • rosuvastatina (Crestor) • atorvastatina (Lipitor) • simvastatina (Zocor) • pravastatina (Pravachol) 	Estabiliza las placas y baja el colesterol	Náusea, dolor de cabeza, estreñimiento	Dolor en los músculos grandes (rabdomiólisis)

Definiciones: ARB: antagonista de los receptores de angiotensina; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; DVT: trombosis venosa profunda; PE: embolia pulmonar; AFib: fibrilación auricular

Tipo de medicamento	Nombre del medicamento genérico (Marca)	Para qué se usa	Efectos secundarios comunes	Efectos secundarios graves (Comuníquese con un médico inmediatamente)
Anticoagulante	<ul style="list-style-type: none"> heparina enoxaparina (Lovenox) 	Evita la formación de coágulos en pacientes con fibrilación auricular	Sangrado menor: <ul style="list-style-type: none"> Encías Sangrado nasal Moretones en la piel 	Sangrado profuso: <ul style="list-style-type: none"> Heces negras o alquitranadas Sangrado incontrolable
	<ul style="list-style-type: none"> warfarina (Coumadin) dabigatrán (Pradaxa) rivaroxabán (Xarelto) apixabán (Eliquis) edoxabán (Savaysa) 	Trata los coágulos de sangre como los de la trombosis venosa profunda (DVT) y la embolia pulmonar (PE)		
Diurético	<ul style="list-style-type: none"> espirolonactona (Aldactone) bumetanida (Bumex) furosemida (Lasix) torsemida (Demadex) hidroclorotiazida 	Trata la insuficiencia cardíaca, presión arterial baja, y libera al cuerpo de excesos de líquido	Aumento en la frecuencia urinaria, náusea, pérdida de apetito, mareos	Sarpullido extenso, confusión, dolor muscular Ginecomastia (aumento de tamaño del tejido mamario)
Inotrópico	<ul style="list-style-type: none"> milrinona dobutamina 	Trata la presión arterial baja severa, tratamiento para la insuficiencia cardíaca	Ansiedad, dolor de cabeza, náuseas, incapacidad para dormir	Latidos irregulares, falta de aliento
Agentes antiarrítmicos	<ul style="list-style-type: none"> amiodarona (Cordarone) 	Trata las arritmias cardíacas como la fibrilación auricular (AFib)	Náusea, anorexia o sensibilidad a la luz	Falta de aliento, visión borrosa, neuralgia, disfunción hepática
	<ul style="list-style-type: none"> diltiazem (Cardizem) 		Edema, dolor de cabeza	Disminución de la presión arterial y el ritmo cardíaco Empeoramiento de la insuficiencia cardíaca
	<ul style="list-style-type: none"> sotalol (Betapace) 		Fatiga, mareos, disminución del ritmo cardíaco	
Insulina	<ul style="list-style-type: none"> glargina (Lantus): acción prolongada lispro (Humalog): acción rápida regular (Humulin R): acción breve 	Reduce el nivel de glucosa (azúcar) en la sangre	Niveles bajos de glucosa en la sangre (hipoglucemia): sudoración, temblores, mareos, confusión, hambre, náuseas, convulsiones	Niveles bajos de glucosa en la sangre (hipoglucemia): sudoración, temblores, mareos, confusión, hambre, náuseas, convulsiones
Vasodilatador	<ul style="list-style-type: none"> nitroglicerina (Nitrostat, Nitro-Bid) mononitrato de isosorbide (Imdur) isosorbide dinitrate (Isordil) hidralazina (Apresoline) 	Previene y trata el dolor de pecho, insuficiencia cardíaca, y presión arterial alta	Dolor de cabeza, presión arterial baja, aturdimiento	Visión borrosa, piel pálida, latidos del corazón que no parecen normal

Definiciones: ARB: antagonista de los receptores de angiotensina; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; DVT: trombosis venosa profunda; PE: embolia pulmonar; AFib: fibrilación auricular