

INHIBIDORES DE LA TIROSINA CINASA (TKI)

DEJE de tomar cualquiera de los siguientes medicamentos de TKI, durante el plazo determinado **previo a cualquier cirugía**.

Medicamentos	Plazo
cabozantinib	4 semanas
sunitinib	1 semana
sorafenib	7 días
lenvatinib	6 días
axitinib	1 día

Reinicie el uso de su medicamento de TKI una vez que se haya recuperado por completo.

Asegúrese de que el medicamento nuevo no interactúe negativamente con su medicamento actual.

Si hay presencia de proteína en su orina, su oncólogo realizará un control.

Lea el dorso de la tarjeta.

Oncólogo: _____

Teléfono: _____



Intermountain[®]
Cancer Centers

Efectos secundarios comunes del medicamento de TKI y tratamiento:

- **Diarrea:** tome loperamida (Immodium), según sea necesario.
- **Sabor metálico:** tome sulfato de zinc de 50 mg, 3 veces al día, según sea necesario.
- **Erupción en las manos o los pies:** tenga cuidado con el agua caliente y trate de evitar lesiones durante el primer mes de la administración de TKI. Use cremas sin alcohol (Bag Balm, Eucerine, Udderly Smooth o clobetasol). Use calcetines o zapatos acolchados.
- **Náuseas:** tome ondansetrón (Zofran), según sea necesario.
- **Fatiga:** realice ejercicio diariamente y siga el mismo horario de sueño.
- **Presión arterial alta:** mida la presión una vez al día. Siga las instrucciones de su médico si su presión arterial está demasiado alta o demasiado baja.
- **Disfunción cardíaca:** realícese un ecocardiograma transtorácico (TTE), un tipo de ECG, para averiguar cuán bien está funcionando su corazón si es que usted tiene factores de riesgo.