


Administrar el pegfilgrastim

El pegfilgrastim es un medicamento que ayuda al cuerpo a crear glóbulos blancos. Se utiliza para disminuir la probabilidad de infección en personas que reciben medicamentos contra el cáncer.

¿Cómo administro el pegfilgrastim?

El pegfilgrastim se administra debajo la piel con una sola jeringa precargada.

- 1 Retire la jeringa precargada del refrigerador y colóquela a temperatura ambiente 30 minutos antes de inyectarla.
- 2 Reúna todos los materiales necesarios: jeringa precargada, almohadilla con alcohol, bola de algodón o almohadilla de gasa, curita y recipiente para instrumentos afilados.
- 3 Asegúrese de que el medicamento de la jeringa precargada sea transparente e incoloro. Revise el nombre del medicamento y la fecha de vencimiento.




Tapa gris de la aguja Medicamento

- 4 Lávese las manos con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos.
- 5 Limpie el sitio de la inyección con una toallita con alcohol y deje que la piel se seque.




- 6 Para elegir un sitio de inyección, consulte la imagen en la parte superior derecha. No inyecte en piel dura, moreteada, agrietada o roja. Elija un sitio de inyección diferente para cada inyección.



- 7 Tire con cuidado de la tapa gris de la aguja para retirarla de la jeringa, en una dirección que apunte lejos de su cuerpo.
- 8 Pellizque el sitio de inyección e inserte la aguja en la piel en un ángulo de 45 a 90 grados.



- 9 Empuje el émbolo hasta que llegue al fondo, luego retire la aguja de la piel, aplique una suave presión con una bola de algodón o una gasa y coloque un vendaje en el sitio si es necesario.
- 10 Tire del protector de seguridad azul hasta que haga clic y cubra la aguja.



- 11 Deseche la jeringa usada en un recipiente adecuado para eliminar instrumentos afilados.

Póngase en contacto con su médico o farmacéutico si tiene alguna pregunta sobre su medicamento.

¿Qué necesito saber sobre cómo administrar el pegfilgrastim?

- Ocasionalmente, se puede presentar dolor y enrojecimiento en el sitio de la inyección. Póngase en contacto con su médico si hay un bulto, hinchazón o hematoma en el sitio de inyección que no desaparece.
- El pegfilgrastim solamente debe inyectarse el día que su médico elija. Administre la inyección al menos 24 horas después y 14 días antes de la siguiente dosis de quimioterapia.
- La cubierta de la aguja de la jeringa precargada de un solo uso contiene caucho natural (látex), que no debe ser manipulada por personas con alergias al látex.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

- Dolor óseo, dolor muscular o posible dolor en las extremidades.
- Si esto sucede, generalmente se puede aliviar con un medicamento para el dolor que no sea aspirina, como acetaminofeno (Tylenol).

¿Cómo debe almacenarse el pegfilgrastim?

- Almacene en el refrigerador entre 36 °F y 46 °F (2 °C a 8 °C).
- No lo congele.
- Mantenga la jeringa precargada en el envase original para protegerla de la luz o de daños físicos.
- No agite la jeringa precargada.
- Saque la jeringa del refrigerador 30 minutos antes de usarla y deje que alcance la temperatura ambiente antes de preparar una inyección.
- Deseche las jeringas que se hayan dejado a temperatura ambiente, de 68 °F a 77 °F (20 °C a 25 °C), durante más de 48 horas.

Notas
