

Plan de alimentación para bebés prematuros tardíos en la guardería: la lactancia y leche de fórmula

Tenga como objetivo amamantar por 10 minutos de cada lado

Llame a la enfermera o especialista en lactancia para evaluar su **calificación de enganche de pezón**. Esto se hace al comienzo de la alimentación cuando su bebé se engancha. Tenga en cuenta que la **succión** de un bebé prematuro tardío no es tan fuerte como la de un bebé que nació a término. Si su bebé no se engancha con éxito después de intentarlo durante 10 o 15 minutos, bombee y complemente con su leche que extrajo o fórmula que dé 22 kilocalorías por onza. Trate de que su bebé se enganche de nuevo en la siguiente alimentación.

Extraiga más leche después de la alimentación si lo desea

Si extrae durante 15 minutos, masajeando los senos y sacando a presión la leche materna por gotas, esta acción ayudará a que su leche madura salga por completo y protegerá su suministro. **Esta es la meta principal.** Con el tiempo, su bebé desarrollará un enganche más fuerte.

Alimentación con complementos para los bebés

Para asegurarse de que su bebé obtenga la nutrición que necesita, **complemente la leche que extraiga o la fórmula en cada alimentación.** Siga la pauta para la alimentación en el siguiente cuadro. **Nota:** Las cantidades en la alimentación para prematuros tardíos son más altas que las de los bebés que nacen a término.



Complemente las alimentaciones en su seno mientras que su bebé está enganchado y succionando. Use un tubo y una jeringa para que la leche adicional llegue a la boca de su bebé. La complementación en el seno hace que el bebé se entrene en el amamantamiento y puede estimular sus senos.

Use un chupón de flujo lento si su bebé no se engancha bien y cuando no sea posible complementar en el seno, o si le da a su bebé más de 20 mL por turno.

Si su bebé sale positivo al bajo nivel de glucosa (azúcar) en el hospital, las alimentaciones se basarán en el peso del bebé (5 mL por cada kilogramo). Las cantidades de la alimentación en el siguiente cuadro son las pautas. Siga las indicaciones que le dé el pediatra.

Días y horas de edad	Cantidad por alimentación (en mililitros o mL)	
	Bebé a término	Bebé prematuro tardío
Día 1: 1 a 24 horas	2 a 10 mL	5 a 10 mL
Día 2: 24 a 48 horas	5 a 15 mL	15 a 30 mL (meta para las 48 horas)
Día 3: 48 a 72 horas	15 a 30 mL	30 a 60 mL
Día 4: 72 a 96 horas	30 a 60 mL	más de 60 mL

Notas

Well-Newborn Nursery Late Preterm Infant Feeding Plan: Breastfeeding and formula

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.



© 2020 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema médico o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Puede obtener más información en intermountainhealthcare.org. FS692S - 06/20 (Last reviewed - 06/20) (Spanish translation 06/20 by CommGap International)