

La administración de antibióticos por vía intravenosa en casa

¿Qué son los antibióticos intravenosos?

Los antibióticos son medicamentos para tratar las infecciones. Los antibióticos intravenosos (IV, por sus siglas en inglés) se aplican con una inyección a un tubo pequeño que llega directamente a una vena.

¿Cuándo necesitaría tomar antibióticos intravenosos en casa?

Algunas veces, cuando comienza a sanar después de una infección grave, puede salir del hospital y seguir recuperándose en casa. Deberá seguir tomando sus antibióticos intravenosos en casa.

¿Qué necesito tener en casa para tomar los antibióticos intravenosos?

Para tomar antibióticos intravenosos en casa, necesita:

- **Un refrigerador** para mantener los antibióticos fríos.
- **Un espacio limpio** para aplicarlos. Es importante que los tubos, las jeringas y su piel estén tan limpios como sea posible y libres de gérmenes.
- **Alguien que pueda inyectar los antibióticos intravenosos cada vez que es necesario** (algunos antibióticos requieren varias dosis al día). Esto lo puede hacer usted u otra persona. Primero, usted o la otra persona necesitan capacitación y deberán ser capaces de seguir instrucciones y usar algunos suministros.
- **Un teléfono que pueda grabar mensajes.** La farmacia le llamará periódicamente para organizar la entrega de los antibióticos. Una enfermera de cuidado domiciliario le llamará cada semana para hacer una cita y tomarle una muestra de sangre. Los servicios de cuidado domiciliario necesitan poder dejar un mensaje para que usted devuelva la llamada si no contesta la primera vez.



Si no puedo aplicarme los antibióticos en casa, ¿hay otras opciones?

Hay varias razones por las que los antibióticos intravenosos en casa no son una buena opción para usted. Hable con su médico o jefe del caso acerca de otras opciones, como las siguientes:

- Terminar las dosis de los antibióticos intravenosos en un centro de planta, como uno especializado de enfermería u hogar para ancianos. Estos centros tienen enfermeras que pueden administrarle los antibióticos intravenosos todos los días.
- Ir a una clínica de salud todos los días para que un cuidador le inyecte los antibióticos.
- Posiblemente, cambiar el antibiótico intravenoso por otro tipo de antibiótico que se toma vía oral, en pastilla o líquido. Esto solo se recetará si se considera que es seguro para usted.

¿Qué sucede cuando tomo antibióticos intravenosos en casa?

La empresa de atención médica domiciliaria le dará instrucciones. En general, usted puede esperar lo siguiente:

- 1 Organización.** Usted organizará su primera entrega de antibióticos de la farmacia, la primera visita de enfermería y una consulta de seguimiento con su médico. Esto lo hará antes de salir del hospital o el día que salga del hospital.
- 2 Capacitación.** La enfermera de salud en el hogar le explicará a usted y a su cuidador cómo inyectar los antibióticos. Esto incluye la cantidad y frecuencia de las dosis. También les enseñará a utilizar el equipo y los suministros.
- 3 Inyecciones diarias.** La enfermera no vendrá a su casa a inyectarle los antibióticos intravenosos. **Usted o su cuidador deben inyectar los antibióticos cada vez que sea necesario.** (Algunos antibióticos deben inyectarse 2 o 3 veces al día).
- 4 Llamadas por teléfono y visitas semanales.** Hay dos grupos que le llamarán frecuentemente cuando tome antibióticos intravenosos en casa. Es muy importante que hable con cada grupo para que pueda seguir tomándolos.
 - La enfermera de salud en el hogar le llamará para organizar una visita cada semana. Le revisarán la línea intravenosa, cambiarán los vendajes y le tomarán una muestra de sangre. La muestra se lleva al laboratorio para asegurar que usted está sanando.
 - La farmacia de salud en el hogar le llamará para organizar la entrega de los antibióticos. Los antibióticos llegarán a su casa en un vehículo de reparto. Usted o su cuidador necesitan estar en casa para firmar el recibo de entrega.
- 5 Dejar de tomar los antibióticos.** Su médico decidirá cuándo puede dejar de tomar los antibióticos intravenosos. El farmacéutico y la enfermera de salud en el hogar le explicarán qué hacer con los antibióticos que no usó y cómo devolver cualquier equipo. Si no devuelve el equipo, se lo pueden cobrar.

¿Qué hago si tengo problemas o preguntas sobre la administración de antibióticos intravenosos en casa?

Puede llamar en cualquier momento si tiene problemas o preguntas.

Farmacia de salud en el hogar

Nombre de la farmacia: _____

Número de teléfono de la farmacia: _____

Enfermería de salud en el hogar

Nombre de la compañía: _____

Número de teléfono: _____

Teléfono fuera de horario: _____

Consultorio de su médico

Nombre del médico: _____

Número de teléfono del médico: _____

¿Cuándo debo llamar para pedir ayuda?

Llame a su enfermera, farmacéutico o médico de inmediato si usted tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Comezón, picazón o ronchas
- Dificultad para respirar e hinchazón de la cara, manos, lengua o garganta
- Diarrea nueva o que empeora
 - Más de 3 veces al día
 - Diarrea con sangre
 - Dolor o cólicos abdominales (en la panza)

No tome ningún medicamento sin receta para tratar la diarrea hasta que hable con su médico.

- Problemas en el sitio de la incisión de la línea intravenosa, como los siguientes:
 - Líquido con fuga o goteo
 - Dolor o hinchazón en el área
 - Manchas rojas debajo de la piel
 - El área se siente caliente

Contenido creado y aprobado por Intermountain Homecare & Hospice

Taking Intravenous (IV) Antibiotics at Home

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.