

Hablemos Acerca De...

Midazolam intranasal (Versed): cómo medir y administrar correctamente una dosis

¿Qué es el midazolam?

Midazolam, también conocido como **Versed**, es un medicamento que se utiliza para tratar ciertos tipos de convulsiones. Se utiliza una jeringa para rociar un fino rocío de medicamento por la nariz del paciente. El medicamento se utiliza para ayudar a controlar las convulsiones en grupos y prolongadas. Las convulsiones prolongadas son las que duran más de 3 a 5 minutos. Las convulsiones en grupos se producen una tras otra.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Entre los efectos secundarios más comunes del medicamento se incluyen:

- Sedación
- Somnolencia
- Mareos
- Irritación nasal
- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Vómitos
- Agitación

¿Cuándo debo pedir ayuda?

Llame inmediatamente al 911 si su niño presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Dificultad para respirar (respiración lenta y superficial).
- El color de la piel se vuelve gris o azul
- Erupción cutánea, urticaria, sibilancias u otros signos de reacción alérgica

Pida a su médico instrucciones sobre cuándo debe utilizarse el medicamento.

Mi médico recomienda dar el medicamento si:

¿Cómo debo guardar el medicamento?

Para almacenar los viales de forma segura y proteger el medicamento, es importante:

- Guardar el medicamento a temperatura ambiente, entre 64 °F y 73 °F (17 °C y 22 °C).
- Guarde el medicamento en la bolsa en la que venía. La bolsa ayudará a protegerlo de la luz y el calor.
- Guarde el medicamento fuera del alcance de los niños. Asegúrese de guardarlo en un lugar al que no puedan acceder fácilmente. Si es posible, guárdelo en un armario con cerradura.
- No utilice el medicamento después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.
- Deseche las jeringas vacías y el dispositivo de atomización de la mucosa (MAD, por sus siglas en inglés) después de cada uso.

Preparación

Necesitará los siguientes suministros para administrar midazolam:

Paño con alcohol



Dispositivo atomizador



Midazolam (vial)



Jeringa con aguja conectada



Preparación de la dosis del medicamento

- 1 Retire la tapa de plástico del vial y limpie la junta de goma con un paño con alcohol.



- 2 Retire la tapa de la aguja.



- 3 Introduzca la aguja en el centro del sello de goma.



- 4 Voltee el vial boca abajo. Tire hacia atrás del émbolo para llenar la jeringa con ____ mililitros (mL) de midazolam.



- 5 Vuelva a colocar la tapa en la aguja. Gire para retirar la aguja de la jeringa. Deseche la aguja en un contenedor rígido para protegerla de pinchazos accidentales.



- 6 Enganche el atomizador a la jeringuilla girándolos entre sí.



Administrar la dosis del medicamento

- 1 Sujete la jeringa entre los 2 primeros dedos. Coloque el pulgar en la parte inferior del émbolo de la jeringa.



- 2 Utilice la otra mano para sujetar la cabeza del niño. Coloque la punta del atomizador contra la fosa nasal (abertura de la nariz). Apunte hacia arriba y hacia la parte superior de la oreja.



- 3 Empuje rápidamente el émbolo para administrar ____ mL en una fosa nasal.



- 4 Pase a la otra fosa nasal y administre los ____ mL de medicamento restantes.



Busque tratamiento de urgencia para su niño en cuanto termine de darle el medicamento.

Intranasal Midazolam (Versed): How to correctly measure and give a dose

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.