



Curtis C. Pedersen, D.P.M.
1300 North 500 East, Suite 130
Logan, Utah 84341
(435) 716-2800



POST-OPERATIVE INSTRUCTIONS FOR NAIL SURGERY INSTRUCCIONES POST-OPERATORIA PARA CIRUGÍA DE UNAS

1. Limite el caminar por el resto del día.
2. Deje el bendaje puesto hasta la mañana siguiente.
3. Compre la medicina y úsela de acuerdo a las instrucciones.
4. La mañana siguiente remoje el bendaje en la siguiente solución: Mezcle una cucharada de Epsom Sal en un cuarto de agua tibia. Remoje el dedo por aproximadamente 10 minutos y remueva el bendaje. Después de haberlo removido, use un algodón ó un hisopo (Q-tip) y limpie el borde donde removieron la una, aplique Neosporine y póngase una curita. Continué remojándose el dedo 2 ó 3 veces al día por 5 días.
5. El quinto día, descontinué el Neosporine y el curita. Solo use medias de algodón y zapatos cómodos. En cuanto descontinué el Neosporine y el curita el área se secura y se sanara más rápido.
6. Continué remojándose el dedo por 10 días hasta que la secreción termine. Si en este tiempo el área se ve seca y no le duele, entonces no necesita volver a la oficina.

Debe llamar ó volver a la oficina sí:

- a. la secreción continua
- b. el dedo esta adolorido ó rojizo
- c. la una le vuelve a crecer

Si tiene alguna pregunta, por favor llame al (435) 716-2800.