

Hablemos Acerca De...

Usted y su niño siempre deben tener a la mano un broche o pinzas en caso de una emergencia. Su enfermera puede facilitarle uno en el hospital. Es recomendable mantener el broche en su llavero para que pueda encontrarlo y usarlo rápidamente.

Si hay un orificio en el catéter:

- 1** Cierre inmediatamente el catéter con el broche. El broche debe colocarse entre el orificio y el niño.
- 2** Llame a la compañía que le presta el servicio de salud en casa y describa la situación a la enfermera de turno.
- 3** Pida que le envíen una enfermera a la casa para que repare inmediatamente el catéter, o vaya a la sala de urgencias, o diríjase al personal especializado en líneas intravenosas del hospital.

Si el catéter se rompe:

- 1** Cierre inmediatamente el catéter con el broche. Si tiene una gaza esterilizada a la mano, colóquela sobre el extremo por donde se rompió el catéter.
- 2** Llame inmediatamente a la compañía que le presta servicio de salud en casa y describa la situación a la enfermera de turno.
- 3** Pida que le envíen una enfermera a la casa para que repare inmediatamente el catéter, o vaya a la sala de urgencias, o diríjase al personal especializado en líneas intravenosas del hospital.

Qué se debe hacer en caso de una emergencia con el catéter central venoso

Si el catéter se sale:

- 1** Presione directamente sobre la parte de la piel por donde sale el catéter del cuerpo.
 - Si su niño tiene un catéter central venoso canalizado (puesto en forma de túnel), presione también el sitio donde el catéter entraba a la vena mayor. Este sitio está cerca del cuello del niño, exactamente donde el cirujano puso un punto cuando el catéter fue puesto originalmente.
- 2** Presione con su mano por 5 minutos usando una gaza o toalla limpia.
- 3** Cuando la hemorragia se detenga:
 - Llame al doctor.
 - Limpie el área por donde sale el catéter con un cotonete (hisopo) con betadine.
 - Ponga un vendaje esterilizado sobre la herida hasta que el doctor pueda ver al niño.
- 4** Si la hemorragia continúa después de 5 minutos, vaya a la sala de urgencias más cercana o llame al 911. Continúe presionando sobre el área afectada.

Si el catéter parece estar obstruido:

- 1** Revise que el catéter no tenga un broche puesto o que no esté enroscado. Remueva los broches y/o desenrede el tubo del catéter. Si el catéter no está enroscado, quite el vendaje y mire si está doblado u obstruido por debajo del vendaje.

2 Los siguientes pasos deben realizarse por un profesional de la salud o alguien que tenga entrenamiento especial:

- Trate de sacar suavemente líquido del catéter con una jeringa de 10 ml. Si puede ver sangre o líquido rosado en el catéter, trate de enjuagar suavemente el catéter con una jeringa de 10 ml. Haga un enjuague de rutina con agua salina para limpiar el catéter y luego enjuágelo con heparina.
- Si no puede sacar líquido del catéter y tampoco puede enjuagarlo, llame inmediatamente a la compañía que le presta servicio de salud en casa y describa el problema a la enfermera de turno. Es necesario actuar rápidamente para asegurarse que el catéter de su niño siga funcionando en forma adecuada.