



# Hablemos Acerca De...

## El testículo no descendido



Testículo no descendido



Reparación quirúrgica del testículo no descendido

A su niño le van a hacer una operación llamada orquiopexia para descender el testículo al escroto (bolsa que contiene a los testículos). Antes de nacer, los testículos se encuentran en el abdomen y normalmente bajan hacia el escroto cuando nace el bebé. Este movimiento es necesario para la seguridad y el desarrollo normal de los testículos. Algunas veces uno u ambos testículos permanecen en el abdomen. Generalmente, los testículos descienden por sí mismos, pero si no sucede se opera al niño para descender los testículos al escroto. Es una cirugía simple y su hijo se puede ir a casa el mismo día.

Se hace una pequeña incisión en la ingle (entrepierna) y otra en el escroto. Luego se baja el testículo al escroto.

Se ponen puntos en la incisión, y la herida se cubre con unas cintas adhesivas llamadas Steri-Strips® (para niños) o colodión (para bebés). Estos puntos se disolverán por sí solos. El escroto de su niño se verá hinchado y moreteado (amorado).

### ¿Cómo debe de cuidar a su niño en casa?

#### Dieta

Comience dándole líquidos claros, como Kool-Aid®, gelatina, agua, y comidas blandas. Vuelva a una dieta regular cuando el niño tolere la comida sin molestias o vómito.

Si su niño presenta náusea y/o vómito:

- Comience nuevamente con líquidos claros. Dele gradualmente alimentos sólidos.
- Llame a su doctor.

#### Cuidados de la incisión

Lave sus manos antes de tocar la herida. No cambie el vendaje hasta que el doctor se lo indique. Mantenga la herida lo más seca y limpia posible.

#### Actividad

- Su niño podrá hacer todo lo que hace normalmente dentro de 3 días, a menos que su doctor indique lo contrario.

- Su niño no debe hacer ninguna actividad que requiera estar sentado con las piernas separadas, como andar en triciclo, bicicleta, o a caballo por 3 semanas.

### **Medicinas**

Al niño se le puede dar ibuprofeno (Advil®), Motrin®) o acetaminofeno (Tylenol®) para el malestar y dolor cada 3-4 horas. Pregunte a su doctor o enfermera por la dosis adecuada. Si requiere otras medicinas, su doctor le dará la receta antes que salga del hospital. Nunca le dé Aspirina a su niño porque está relacionada con una enfermedad del hígado y cerebro llamada Síndrome de Reye.

### **Baño**

No le dé al niño baños de tina (bañera) hasta por lo menos 2 días después de la cirugía, o hasta que su doctor se lo indique. Los baños de esponja son apropiados durante los primeros 2 días. Por los siguientes 3 días es mejor poner muy poca agua en la tina y salpicar el cuerpo y la herida con agua. Puede bañar a su niño con normalidad 5 días después de la cirugía. Seque cuidadosamente las cintas adhesivas que cubren la incisión.

### **Llame a su doctor si...**

- Su niño tiene el escroto muy hinchado. Recuerde que es normal que esté un poco hinchado o moreteado (amorado).
- Hay enrojecimiento e hinchazón en la herida, especialmente si hay pus.
- Su niño tiene fiebre de más de 101° Fahrenheit (38.4° Centígrados). Es común tener una fiebre leve después de la cirugía.
- Su niño tiene molestias constantes que no se alivian con Tylenol® o con la medicina para el dolor recetada por su doctor.
- Usted detecta una mancha de sangre de más de 2 pulgadas (5 centímetros) de diámetro. Un poquito de sangre es normal.

### **Seguimiento**

Es muy importante que el cirujano examine a su niño, generalmente 3-6 semanas después de la operación. Haga una cita con la oficina de su doctor antes de irse del hospital el día de la cirugía. Si no puede asistir a la cita, por favor llame a la oficina de su cirujano 3 semanas después de la operación para informarles cómo se encuentra su niño.



Pediatric Education Services  
(801) 588-4060 Rev 4/04  
© Primary Children's Medical Center 2004  
*Undescended testicle*

Toda la información contenida en las series *Hablemos Acerca de... tiene* solamente un propósito educativo. Esta información educacional no sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.