

Para un aislamiento de riesgo variable, la protección de los ojos puede incluir gafas de seguridad, protectores faciales o anteojos. Para conservar la escasez de recursos se asignarán individualmente gafas de seguridad, anteojos o protectores faciales a los proveedores, se desinfectarán como se menciona abajo y se guardarán en una bolsa con el nombre del proveedor.

Si utiliza una bata lavable de aislamiento, revise las instrucciones de [Colocar y quitar la bata de aislamiento lavable y los guantes](#).

Para colocarse el protector

El protector de ojos debe colocarse afuera del área de atención al paciente o en una antesala.

1 Asegúrese de que haya guantes, toallitas desinfectantes y un basurero afuera de la habitación.

Asegúrese de que la bolsa de almacenamiento también esté afuera de la habitación para usarla después de quitarse y desinfectar los protectores de ojos.

2 Lávese las manos antes de colocarse la bata.



3 Bata

- Colóquese la bata de aislamiento.
- Amarre por detrás del cuello y alrededor de la cintura.

4 Máscara

- Colóquese la máscara sobre su nariz y boca.
- Moldee la parte de la nariz de la máscara a la forma de su nariz.

5 Protección de ojos


- Colóquese el protector de ojos, tales como las gafas de seguridad, los anteojos o el protector facial.
- Es aceptable usar una máscara quirúrgica o de procedimientos junto con el protector de ojos.

6 Guantes

- Colóquese los guantes.
- Asegúrese de que los guantes cubran los puños de la bata.



No se necesita usar botines desechables o mallas para el cabello para personas bajo investigación de COVID-19 o pacientes con COVID-19



Para quitarse el protector

1 La bata y los guantes deben quitarse dentro de la habitación del paciente en la puerta antes de salir del área de atención. El protector de ojos y la máscara quirúrgica deben quitarse afuera de la habitación del paciente o área de atención.

2



Bata y guantes

- Puede que los guantes y la bata estén contaminados. Evite contaminarse, contaminar a otros, y al ambiente cuando se los quite. Si está extremadamente contaminado, limpie el protector con una toallita desinfectante antes de quitárselo.
- Desamarre o rompa las tiras de la bata al jalar cuidadosamente por la parte delantera de la bata.
- Con cuidado, quítese la bata y los guantes como si estuviera pelando de adentro hacia afuera, enróllelos y bótelos.
- Lávese las manos.
- **Salga del área de atención al paciente.**



SALIDA

3



Protección de ojos

- Lávese las manos.
- Póngase guantes limpios.
- Saque una toallita desinfectante del dispensador antes de quitarse las gafas de protección, el protector facial o los anteojos.
- Quítese el protector de ojos con mucho cuidado, tocando solo la banda en los costados. Evite colocar el protector de ojos en una superficie limpia hasta después que haya sido desinfectada.
- Desinfecte el protector de ojos usando toallitas de tapa morada, gris o naranja.
 - Asegúrese que el tiempo de contacto se cumpla según el uso de las toallitas: tapa morada (2 minutos), tapa gris (3 minutos), tapa naranja (4 minutos)
- Coloque el protector de ojos en una bolsa individual con el nombre del proveedor. Desinfecte la parte exterior de la bolsa de almacenamiento con una toallita desinfectante nueva. Mantenga la bolsa en un área limpia.
- Limpie el dispensador de toallitas con una nueva toallita. Si es posible que alguna superficie se haya contaminado, desinfecte la superficie.
- Quítese los guantes.
- Lávese las manos.



4



Máscara

- Quítese la máscara quirúrgica cuidadosamente, tocando solo los elásticos o lazos y deséchela de manera segura.
- Lávese las manos.

