


# Hablemos Acerca De...

## Gastrosquisis

La **gastrosquisis** es una alteración que surge durante el desarrollo del bebé antes del nacimiento. La piel y los músculos que recubren parte del abdomen no se forman por completo. A causa de ello, se forma una abertura en el abdomen que suele estar a la derecha del cordón umbilical. Los intestinos pasan por esa abertura y se encuentran fuera del cuerpo cuando el bebé nace. Debido a que los intestinos permanecen fuera en el líquido amniótico durante un tiempo prolongado, se vuelven más gruesos y no funcionan bien al principio.



### ¿Cómo se trata la gastrosquisis?

Un cirujano se encargará de colocar los intestinos en el interior del abdomen del bebé y de cerrar la abertura. Hasta el momento de la operación, los intestinos del bebé se colocarán en un silo (una bolsa blanda de plástico). Al bebé se le mantendrá a buena temperatura para ayudarlo a retener los líquidos y el calor del organismo. También se le administrarán líquidos y antibióticos por medio de una vía intravenosa (un tubo pequeño que se introduce en una vena).


Durante este período, no se podrá alimentar al bebé normalmente. En lugar de ello, se le suministrará un líquido llamado “nutrición parenteral total” a través de una vía intravenosa. Ese líquido tiene proteínas, grasas, azúcar, vitaminas y minerales que permitirán satisfacer las necesidades alimenticias del bebé.

Al bebé se le colocará un tubo por la nariz (sonda nasogástrica) o por la boca (sonda buco-gástrica), que se prolongará hasta llegar al estómago. Ese tubo evita que se atragante o aspire el contenido del estómago hacia los pulmones.

Durante la operación quirúrgica, los órganos del bebé se volverán a colocar dentro del abdomen. Según lo que el bebé necesite, el cirujano reparará la gastrosquisis con un cierre principal (todo de una vez) o con un cierre por etapas (de a poco en el transcurso de varios días).

### Cierre principal

El cirujano coloca los intestinos y demás órganos en el interior del abdomen y cierra la piel con puntos de sutura.



## Cierre por etapas

A veces, no es posible colocar los intestinos en el interior del abdomen en la primera operación. Esto se debe a que los intestinos no caben en el abdomen de inmediato. En ese caso, los intestinos se colocan en un silo (una bolsa estéril) durante un breve lapso. El silo con los intestinos dentro se une al abdomen y se mantiene a una altura superior a la que se encuentra el bebé.

En el transcurso de los siguientes días o semanas, el cirujano va colocando pequeñas partes del intestino en el interior del abdomen, hasta que todos los órganos se encuentren dentro. Luego cierra la piel con puntos de sutura.

## ¿Cómo recibirá alimentos el bebé?

Por un tiempo, el bebé no podrá comer y tendrá colocada una vía intravenosa especial que se llama “vía central”, la cual se puede dejar colocada durante



un tiempo más prolongado que una vía intravenosa normal. A través de ella, se suministra nutrición parenteral total para que el bebé reciba la nutrición que necesita. Es posible que el bebé necesite ese líquido durante varias semanas o meses, lo cual depende de la rapidez con la que sus intestinos comiencen a trabajar.

Una vez que la totalidad de los intestinos se encuentre dentro del cuerpo, el bebé deberá defecar (hacer popó). Los intestinos también deben funcionar correctamente. Entonces, el bebé podrá comenzar a recibir alimentos en pequeñas cantidades. La nutrición parenteral total comenzará a reducirse poco a poco, hasta que el bebé reciba toda la nutrición que necesite alimentándose normalmente. Ese proceso podría ser muy lento y a veces los bebés sufren recaídas. Si eso ocurre, hay que dejar de alimentarlo normalmente durante un tiempo y luego volver a comenzar poco a poco.

## ¿Cuándo puedo llevar a mi bebé a casa?

El bebé podrá regresar a casa en cuanto haya aumentado de peso y se alimente totalmente por boca.

Gastroschisis

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.