

Resfriados y la tos en niños y adolescentes: manejo de las infecciones virales

La tos, la secreción (moqueo) y congestión nasal, así como otros síntomas de resfriado pueden hacerlo sentirse muy mal, sin embargo estos síntomas no suelen ser serios. La mayoría son causados por virus y mejoran con tiempo y descanso. Rara vez se necesitan antibióticos, y estos pueden provocar más daño que bien.

Este folleto responde a las preguntas frecuentes más comunes, le proporciona sugerencias para ayudar a aliviar los síntomas y le aconseja sobre cuándo debe llamar al médico.

¿Qué puedo hacer?

- **Obtenga más información** sobre los síntomas de su niño, lo que usted puede hacer para sentirse mejor, y cuándo consultar a su médico. Este folleto puede ayudarle.
- **Si tiene una cita con el médico, haga preguntas:**
 - **Si su médico le indica que tomar un antibiótico no es necesario, no insista.** Pídale a su médico que le explique por qué los antibióticos no serán de ayuda y qué puede hacer en lugar de tomarlos. Puede consultar los consejos de la página 3.

- **Si su médico le receta antibióticos, pregúntele la razón.** ¿Qué tipo de infección bacteriana tratará?

¿Por qué no va al médico dar a mi niño un antibiótico?

- **Los antibióticos matan a las bacterias, no a los virus.** Los resfriados y la mayoría de los dolores de garganta y tos son causados por virus. Los antibióticos NO curan a los virus, y NO ayudan a alguien con una infección viral a sentirse mejor más rápidamente.
- **El uso de antibióticos cuando no son necesarios puede causar más daño que bien.**
 - Las bacterias comienzan a crear resistencia a los antibióticos. Esto se conoce como **resistencia a los antibióticos**, y constituye un grave problema a nivel mundial. Entre más antibióticos se utilicen, más resistentes se volverán las bacterias. Es posible que los antibióticos comunes no puedan combatir a estos gérmenes resistentes, y sean necesarios antibióticos más tóxicos y costosos. En ocasiones, las infecciones bacterianas resistentes necesitan ser atendidas en un hospital, incluso, pueden causar la muerte.
 - Al igual que con muchos medicamentos, usted podría presentar reacciones alérgicas o efectos secundarios inesperados.

Comprender los síntomas de su niño

Cuando los virus infectan las vías respiratorias de su niño (nariz, garganta y pecho), pueden provocar cualquiera o todos los siguientes síntomas de resfriado o gripe:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • secreción (moqueo) | • dolor de cabeza |
| • tos | • dolor del cuerpo |
| • dolor de garganta | • fiebre |
| • estornudos | • escalofríos |
| • ojos llorosos | • cansancio |

Es normal que los síntomas de una infección viral persistan hasta por 14 días, y en ocasiones, incluso durante más tiempo. Para la mayoría de las personas, los peores síntomas desaparecen en aproximadamente 10 días, aunque la tos puede durar hasta tres semanas. Recuerde que los antibióticos no hacen que las enfermedades virales se curen más rápido. Por lo general, sólo necesitan seguir su propio curso, y lo mejor es esperar y observar. Siga los consejos en la página siguiente para el alivio de los síntomas, y consulte el listado en la página 4 para obtener consejos sobre cuándo llamar al médico.

¿Cuándo debe preocuparse por el dolor de garganta?

El dolor de garganta puede ser preocupante. Eso se debe a que existe una infección bacteriana de la garganta bastante común “llamada faringitis” por estreptococos. Si ésta no se trata con antibióticos, puede conducir a problemas más serios. ¿Cuándo se debe sospechar que se tiene una faringitis por estreptococos? Éstos son algunos indicativos:

- **Probablemente SÍ se trate de faringitis por estreptococos:** dolor de garganta por sí mismo, o dolor de garganta con fiebre, dolor de cabeza, erupción en la piel con apariencia de quemadura solar o incluso vómito. Si usted piensa que sufre de faringitis por estreptococos, consulte al médico. La única manera de confirmarlo es mediante un análisis de laboratorio.
- **Probablemente NO se trate de faringitis por estreptococos:** dolor de garganta acompañado de tos o secreción (moqueo) o congestión nasal.

¿Es necesario tomar un antibiótico si se tiene mucosidad espesa y de color verdoso?

Cuando los gérmenes que causan los resfriados o la gripe infectan la nariz, ésta produce mucosidad para ayudar a eliminar estos gérmenes. Al principio, la mucosidad clara, pero a medida que las células inmunológicas del organismo combaten a los gérmenes, la mucosidad comienza a cambiar de color. Primero es blanca o amarillenta, y más adelante puede ser verdosa. Esto es normal, y no significa que usted necesite un antibiótico. Aún así, si no mejora después de unos 10 días — o si síntomas de su niño son graves — vea al médico. Es posible su niño ha desarrollado una infección de los senos paranasales y requiera de antibióticos.

¿Cuándo debe preocuparse por la tos?

La tos es molesta, pero la mayoría del tiempo no es grave. Incluso la **bronquitis** (inflamación de las vías respiratorias mayores de los pulmones), por lo general es causada por un virus y sana por sí sola en unas tres semanas. Sin embargo, la tos en los niños pequeños debe ser vigilada cuidadosamente. Podría tratarse del virus sincitial respiratorio (RSV, por sus siglas en inglés). El **RSV** es un virus común que sólo causa síntomas leves en adultos y niños mayores — pero en los bebés puede provocar infecciones graves que pueden empeorar rápidamente. Consulte la última página sobre cuándo llamar al médico.

¿Por qué no tomar un antibiótico para prevenir una infección bacteriana?

La mayoría de las infecciones virales NO ocasionan infecciones bacterianas. El uso de antibióticos para prevenir una infección bacteriana sólo contribuye a crear resistencia a los antibióticos. Es posible que ese mismo antibiótico le haga efecto la próxima vez que lo necesite, y si usted contrae una infección, podría ser mucho más grave y difícil de tratar. Lo mejor es esperar y tomar un antibiótico sólo si se confirma que se trata de una infección bacteriana.

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi niño sentirse mejor?

Una infección viral por lo general sólo dura una o dos semanas. Pero cuando se siente muy mal (o sobre todo, cuando se trata de su niño), ¡puede parecer una eternidad! Estos son algunos consejos para ayudarle a aliviar los síntomas y ayudar a su niño se mejore más rápido:

- **Reposo.** Esta es una de las mejores cosas que puede hacer por su niño enfermo. No lleve a su niño a la escuela o guardería.
- **Beba mucha agua y otros líquidos.** Beber agua adelgaza la mucosidad y ayuda a aliviar la tos, la congestión nasal y el dolor de garganta. Otros líquidos, incluso la leche, por lo general también son otra opción.
- **Enjuáguese los senos nasales de su niño con agua salada.** Consulte las indicaciones en la parte inferior de esta página.
- **Utilice un humidificador.** Utilice un humidificador de vapor frío cerca de los niños. No permita que la habitación se humedezca demasiado, no debe haber humedad en las ventanas. Además, siga las indicaciones del producto para mantener limpio el humidificador.

- **Evite el humo de cigarrillos.** El humo de cigarrillos empeora los síntomas y retrasa la recuperación. No permita que nadie fume dentro de casa, y si usted fuma, evite hacerlo por algunos días, o fume afuera solamente. Consulte el reverso de la página para obtener recursos para ayudarle a dejar de fumar.

¿Qué ocurre con los medicamentos de venta sin receta?

La Academia Estadounidense de Pediatría no recomienda ningún tipo de remedio de venta sin receta para aliviar el resfriado y la tos en niños menores de 4 años (y sólo si es recomendado por un médico para las edades de 4 a 6). Estos medicamentos no ayudarán a su niño a recuperarse más rápidamente. Para niños mayores de 4, algunas personas encuentran que ayudan a aliviar los síntomas y deje que su niño descanse más fácil. Éstas son algunas pautas generales:

- **Para el dolor o la fiebre:** tome acetaminofén (como Tylenol) o ibuprofeno (como Advil o Motrin). Muchos especialistas recomiendan que las personas con asma o con antecedentes familiares de asma eviten tomar ibuprofeno y naproxeno sódico (como Aleve), ya que pueden agravar o estimular la aparición del asma. NO les dé aspirinas a niños ni adolescentes.
- **Para aliviar el dolor de garganta:** las pastillas o caramelos para la garganta pueden ayudar a aliviar una garganta adolorida y seca. (No les dé pastillas para la garganta a los niños menores de 5 años, ya que pueden ahogarse.) También puede intentar hacer gárgaras con agua salada. Use la solución salina descrita en el paso 1 a continuación.

- **Para la congestión o secreción nasal:** No se conocen bien los efectos de los descongestionantes y los antihistamínicos en los niños. A algunas personas les resultan útiles; sin embargo, otras consideran que los efectos secundarios son mayores que los beneficios. Siga las instrucciones del empaque si decide darle medicamentos para el resfriado a su niño mayor de 4 años.
- **Para la tos:** la tos puede ser un indicador de asma u otros problemas graves. Consulte al médico si tiene síntomas de tos similares a los descritos en la página 4. Puede intentar tomar medicamentos para aliviar la tos en casa, aunque los estudios demuestran que la mayoría no funcionan. Puede resultar útil aplicar Vicks VapoRub en el pecho de los niños mayores de 2 años.

¿Cuándo debo llamar al médico?

La mayoría de los síntomas de los resfriados y de la gripe mejoran por sí solos con tiempo y reposo. Sin embargo, con algunos síntomas, es aconsejable ver a un médico. Un médico puede asegurarse de que nada sea demasiado grave, recetar medicamentos si son necesarios y darle sugerencias para ayudarle a sentirse mejor. Estos son algunos consejos sobre cuándo llamar al médico.

Fiebre:

- Para los bebés menores de 90 días de edad (3 meses): fiebre de 100.4°F o superior
- Para los bebés de 90 a 180 días de edad (3 a 6 meses): fiebre de 101.0°F o más
- Para los niños mayores de 6 meses: fiebre alta (103.0°F o más) y el niño parece enfermo de lo que esperas
- Cualquier tipo de fiebre que dure 2 días o más y no mejore

¡El agua salada al rescate!

Para ayudar a aliviar la nariz congestionada, intente enjuagarse los senos paranasales de su niño con agua salada una o dos veces al día. Esto puede parecer un poco caótico, pero es una de las mejores cosas que se pueden hacer para ayudar a solucionar un problema de sinusitis. Haga lo siguiente:

- 1 Prepare un enjuague de agua salada, mezclando una taza de agua destilada, hervida o filtrada con ½ cucharadita de sal. (También, puede comprar un enjuague a base de solución salina en la tienda.)
- 2 Vierta el enjuague de agua salada en una pera de goma o en una botella con atomizador. En caso de que sea para un bebé, ponga el agua salada en un cuentagotas (gotero).
- 3 Con la cabeza de su niño sobre el lavabo, inclínela hacia un lado.
- 4 Con la ayuda de la pera de goma, botella con atomizador o gotero, inyecte un chorro de agua salada en la fosa nasal superior.
- 5 Permita el agua salada corra de la fosa nasal superior a la fosa nasal inferior. Un poco de agua puede salir de la fosa nasal inferior, y algo más puede pasarse por la parte posterior de la garganta. Esto está bien, el objetivo es enjuagar los senos paranasales lo mejor posible.
- 6 Repita los pasos 3 a 5 con la otra fosa nasal.

Tos:

- Tos en el bebé que le dificulta comer o dormir, especialmente si el bebé es menor de 6 meses de edad
- Tos similar al ladrido de una foca, y que interfiere con la respiración
- Tos repentina y que no cede por más de una hora
- Tos con sibilancias (silbidos al inhalar y exhalar)
- Tos acompañada de dolor de pecho
- Tos que no mejora después de tres semanas

Secreción o congestión nasal:

- Congestión nasal que no mejora después 10 días, o desaparecido después de 3 a 4 semanas
- Congestión nasal acompañada de otros síntomas que parecen ser graves (como fiebre alta, dolor de oído, o dolor en las mejillas)

Dolor de oído:

- Dolor de oído que interfiere con el sueño u otras actividades cotidianas
- Dolor de oído sin fiebre que no disminuye después de 2 días (Puede darle ibuprofeno para el dolor de oído)

Dolor de garganta:

- Dolor de garganta sin otros síntomas comunes de resfriado
- Dolor de garganta con fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago, erupción en la piel o vómito
- Dolor de garganta que es tan severo que es difícil de tragar
- Dolor de garganta severo que parece ser peor de lo que podría esperar con un resfriado

Problemas respiratorios:

- Respiración acelerada o superficial
- Dificultad para respirar
- La piel se hunde entre las costillas o debajo de la garganta cada vez que respira
- Color azulado en los labios o en las uñas

¿Cuándo debería llamar a mi médico?

Llame al médico si cualquier síntoma empeora o no disminuye en 10 días. Consulte la sección “Cuándo llamar al médico” en la página siguiente.

Llame al médico si cualquiera de los síntomas no han mejorado después de 14 días, **o si su niño no parece estar bien.**

¿Cómo puedo evitar que mi familia no se enfermen?

Los resfriados, la gripe y otras infecciones virales son comunes. Casi todas las personas tienen al menos un resfriado al año, ¡y con frecuencia los niños sufren de resfriados hasta 12 veces! Para ayudar a limitar el número de resfriados que sufre su familia, siga los siguientes consejos:

- Lávese las manos con frecuencia o utilice un limpiador de manos desinfectante. También recuérdale a sus niños (y a quienes los cuidan) lavarse las manos frecuentemente. Esta es una de las mejores cosas que puede hacer para mantenerse sano y evitar la propagación de virus.
- Evite las multitudes. Si lleva a su niño a una guardería, trate de encontrar una guardería con pocos niños en cada salón. Y si es posible, evite lugares públicos concurridos durante la temporada de gripe.
- Vacúnese contra la gripe cada año. Asegúrese de que todos los miembros de su familia también lo hagan. Sólo previene la gripe, no el resfriado común y la tos. Sin embargo, ha sido probado que evitar la gripe ayuda a prevenir tanto complicaciones comunes como graves.
- Evite el humo de cigarrillo. Si usted fuma, haga todo lo posible para dejar de hacerlo. De igual forma, evite el humo de fumador pasivo. Éstos son algunos recursos que pueden ayudarle:
 - Pídale a su proveedor de atención médica el folleto de Intermountain *Dejar el Tabaco: Su Viaje a la Libertad*.
 - Visite el sitio web de salud preventiva de Intermountain: intermountainhealthcare.org/prevention.
 - Llame a la Línea Para Dejar el Tabaco, al 1-888-567-TRUTH (en inglés) o al 1-877-629-1585 (en español)