

# Guía de dosificación pediátrica: Acetaminofeno (Tylenol)

**Consulte el envase del medicamento para ver las indicaciones y advertencias completas.** Siga siempre las indicaciones de su pediatra. Tomar demasiado acetaminofeno puede causar problemas.

Llame a su pediatra inmediatamente si un niño menor de 3 meses tiene fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior (a menos que el niño haya recibido vacunas el día de hoy).

Siga estos consejos para darle a su niño la dosis correcta de acetaminofeno:

- **Use el peso del niño y la tabla a continuación para seleccionar la dosis correcta.**
- **No administre acetaminofeno durante más de 7 días consecutivos sin hablar con su pediatra.**
- Puede administrar las dosis que se indican en la tabla a continuación cada 4 horas, si es necesario. Administre la cantidad mínima de dosis necesarias para ayudar a que el niño se sienta mejor.  
**No administre más de 5 dosis en el lapso de 24 horas.**



- Muchos medicamentos para el dolor de venta libre y con receta médica contienen acetaminofeno. Por ejemplo, DayQuil contiene acetaminofeno. Lea las etiquetas y **no le dé a su niño más de 1 medicamento que contenga acetaminofeno** sin antes hablar con el médico de su niño.

## Guía de dosificación de acetaminofeno (Tylenol)

Peso (libras)	Dosis	Jarabe líquido para niños (use la cuchara proporcionada)	Tabletas masticables o solubles para niños	Tabletas masticables o solubles para niños mayores
<b>Concentración</b>		<b>160 mg / 5 mL</b>	<b>80 mg</b>	<b>160 mg</b>
9–11 lbs	60 mg	1.9 mL		
12–17 lbs	80 mg	2.5 mL		
18–23 lbs	120 mg	3.75 mL		
24–35 lbs	160 mg	5 mL	2 tabletas	
36–46 lbs	240 mg	7.5 mL	3 tabletas	
47–58 lbs	320 mg	10 mL	4 tabletas	2 tabletas
59–70 lbs	400 mg	12.5 mL	5 tabletas	2½ tabletas
70+ lbs	480 mg	15 mL	6 tabletas	3 tabletas

# Guía de dosificación pediátrica: Ibuprofeno (Motrin, Advil)

**No administre ibuprofeno a niños menores de 6 meses.** Consulte el envase del medicamento para ver las indicaciones y advertencias completas. Siga siempre las indicaciones de su pediatra. Tomar demasiado ibuprofeno puede causar problemas.

Llame a su pediatra inmediatamente si su niño menor de 3 meses tiene fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior.

Siga estos consejos para darle a su niño la dosis correcta de ibuprofeno:

- Revise el frasco para determinar la concentración que tiene. El ibuprofeno líquido está disponible en diferentes concentraciones.
- Use el peso del niño y la tabla a continuación para seleccionar la dosis correcta.
- No administre ibuprofeno durante más de 7 días consecutivos sin hablar con su pediatra.**



- Puede administrar las dosis que se indican en la tabla a continuación cada 6 horas, si es necesario.** Administre la cantidad mínima de dosis necesaria para ayudar a que el niño se sienta mejor. **No administre más de 4 dosis en el lapso de 24 horas.**
- Administre la cantidad mínima de medicamento necesaria para ayudar a que el niño se sienta mejor.** La mitad de la dosis recomendada puede ser eficaz.

Si a su niño le van a hacer una cirugía dentro de 1 semana, **no le dé ibuprofeno**. Este medicamento puede aumentar levemente el riesgo de sangrado.

## Guía de dosificación de ibuprofeno (Motrin, Advil)

Peso (libras)	Dosis (hasta)	Gotas infantiles (use el gotero proporcionado)	Líquido para niños (use la jeringa o cuchara proporcionada)	Tabletas masticables para niños mayores	Tabletas fáciles de traguar para niños mayores	Tabletas regulares para adultos
Concentración		50 mg / 1.25 mL	100 mg / 5 mL	100 mg	100 mg	200 mg
11–16 lbs	50 mg	1.25 mL	2.5 mL			
17–21 lbs	75 mg	1.9 mL	3.75 mL			
22–32 lbs	100 mg		5 mL	1 tableta		
33–43 lbs	150 mg		7.5 mL	1½ tabletas		
44–54 lbs	200 mg		10 mL	2 tabletas	2 tabletas	
55–65 lbs	250 mg		12.5 mL	2½ tabletas	2½ tabletas	1 tableta
66–87 lbs	300 mg		15 mL	3 tabletas	3 tabletas	1 a 1½ tabletas
88+ lbs	350 mg		17.5 mL	3½ tabletas	3½ tabletas	1½ a 2 tabletas

Pediatric Dosing Guide

Intermountain Health cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.

© 2015-2025 Intermountain Health. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema médico o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Para más información visite [intermountainhealth.org](http://intermountainhealth.org). CLD003S - 03/25 (Last reviewed - 03/25) (Spanish translation by CommGap).