

Guía de dosificación pediátrica: Acetaminofeno (Tylenol)

Consulte el envase del medicamento para ver las indicaciones y advertencias completas. Siga siempre las indicaciones de su pediatra. Tomar demasiado acetaminofeno puede causar problemas.

Llame a su pediatra inmediatamente si un niño menor de 3 meses tiene fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior (a menos que el niño haya recibido vacunas el día de hoy).

Siga estos consejos para darle a su niño la dosis correcta de acetaminofeno:

- **Use el peso del niño y la tabla a continuación para seleccionar la dosis correcta.**
- **No administre acetaminofeno durante más de 7 días** consecutivos sin hablar con su pediatra.
- Puede administrar las dosis que se indican en la tabla a continuación cada 4 horas, si es necesario. Administre la cantidad mínima de dosis necesarias para ayudar a que el niño se sienta mejor. **No administre más de 5 dosis en el lapso de 24 horas.**



- Muchos medicamentos para el dolor de venta libre y con receta médica contienen acetaminofeno. Por ejemplo, DayQuil contiene acetaminofeno. Lea las etiquetas y **no le dé a su niño más de 1 medicamento que contenga acetaminofeno** sin antes hablar con el médico de su niño.

Guía de dosificación de acetaminofeno (Tylenol)

Peso (libras)	Dosis	Jarabe líquido para niños (use la cuchara proporcionada)	Tabletas masticables o solubles para niños	Tabletas masticables o solubles para niños mayores
Concentración		160 mg / 5 mL	80 mg	160 mg
9 – 11 lbs	60 mg	1.9 mL		
12 – 17 lbs	80 mg	2.5 mL		
18 – 23 lbs	120 mg	3.75 mL		
24 – 35 lbs	160 mg	5 mL	2 tabletas	
36 – 46 lbs	240 mg	7.5 mL	3 tabletas	
47 – 58 lbs	320 mg	10 mL	4 tabletas	2 tabletas
59 – 70 lbs	400 mg	12.5 mL	5 tabletas	2½ tabletas
70+ lbs	480 mg	15 mL	6 tabletas	3 tabletas

Guía de dosificación pediátrica: Ibuprofeno (Motrin, Advil)

No administre ibuprofeno a niños menores de 6 meses. Consulte el envase del medicamento para ver las indicaciones y advertencias completas. Siga siempre las indicaciones de su pediatra. Tomar demasiado ibuprofeno puede causar problemas.

Llame a su pediatra inmediatamente si su niño menor de 3 meses tiene fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior.

Siga estos consejos para darle a su niño la dosis correcta de ibuprofeno:

- Revise el frasco para determinar la concentración que tiene. El ibuprofeno líquido está disponible en diferentes concentraciones.
- Use el peso del niño y la tabla a continuación para seleccionar la dosis correcta.
- **No administre ibuprofeno durante más de 7 días** consecutivos sin hablar con su pediatra.



- **Puede administrar las dosis que se indican en la tabla a continuación cada 6 horas, si es necesario.** Administre la cantidad mínima de dosis necesaria para ayudar a que el niño se sienta mejor. **No administre más de 4 dosis en el lapso de 24 horas.**
- **Administre la cantidad mínima de medicamento necesaria para ayudar a que el niño se sienta mejor.** La mitad de la dosis recomendada puede ser eficaz.

Si a su niño le van a hacer una cirugía dentro de 1 semana, **no le dé ibuprofeno.** Este medicamento puede aumentar levemente el riesgo de sangrado.

Guía de dosificación de ibuprofeno (Motrin, Advil)

Peso (libras)	Dosis (hasta)	Gotas para niños (use el gotero proporcionado)	Líquido infantil (use la jeringa o cuchara proporcionada)	Tabletas masticables para niños mayores	Tabletas fáciles de tragar para niños mayores	Tabletas regulares para adultos
Concentración		50 mg / 1.25 mL	100 mg / 5 mL	100 mg	100 mg	200 mg
11–16 lbs	50 mg	1.25 mL	2.5 mL			
17–21 lbs	75 mg	1.9 mL	3.75 mL			
22–32 lbs	100 mg		5 mL	1 tableta		
33–43 lbs	150 mg		7.5 mL	1½ tabletas		
44–54 lbs	200 mg		10 mL	2 tabletas	2 tabletas	
55–65 lbs	250 mg		12.5 mL	2½ tabletas	2½ tabletas	1 tableta
66–87 lbs	300 mg		15 mL	3 tabletas	3 tabletas	1 a 1½ tabletas
88+ lbs	350 mg		17.5 mL	3½ tabletas	3½ tabletas	1½ a 2 tabletas

Pediatric Dosing Guide

Intermountain Health cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.

©2015-2024 Intermountain Health. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema médico o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Para más información visite intermountainhealth.org. CLD003S - 02/24 (Last reviewed - 02/24) (Spanish translation by CommGap).