

# Tratamiento Tri-mix para la disfunción eréctil

Tri-mix contiene 3 medicamentos (alprostadil, fentolamina y papaverina) que trabajan juntos para elevar el flujo de sangre al pene para provocar una erección. Este tratamiento, el cual se administra como inyección, permite tener relaciones sexuales.

## ¿En qué casos se emplea Tri-mix?

Un médico suele solicitar Tri-mix cada vez que otros dispositivos o medicamentos no funcionan o provocan efectos secundarios.

## ¿Me dará resultados Tri-mix?

Tri-mix funciona en aproximadamente 9 de cada 10 pacientes. A diferencia de los medicamentos orales, las inyecciones de Tri-mix provocan una erección automática. La inyección puede aplicarse 5 minutos antes de tener relaciones sexuales y los efectos no deben durar más de una hora.

## ¿Cómo me aplico una inyección de Tri-mix por mi propia cuenta?

Se aplica Tri-mix en el pene con una aguja pequeña. Siga las siguientes instrucciones paso por paso.

### Paso 1

- Tenga a mano toallitas impregnadas con alcohol, jeringa con aguja, medicamentos y un contenedor de objetos punzocortantes.
- Lávese las manos.




### Paso 2

- Limpie la parte superior de goma del frasco con la toallita impregnada en alcohol.
- Llene la jeringa con una parte de aire igual a la dosis, inserte la aguja en la tapa de goma, llene la parte de aire y voltee el envase de cabeza.
- Llene la jeringa con medicamento hasta la dosis indicada.
- Golpee los lados de la jeringa para que las burbujas de aire se deslicen hacia arriba. Elimine las burbujas antes de usar.
- Retire la aguja del frasco y vuelva a tapar la aguja.

### Paso 3


- Ubique el sitio de la inyección entre la base y la parte media del pene a las 9-11 o 1-3 en punto.



- Evite cualquier vena o arteria visible en la superficie.

### Paso 4

- Limpie el sitio con una toallita impregnada en alcohol y espere a que se seque.
- Retire la tapa de la jeringa.
- Coloque la cabeza del pene en dirección al costado de la pierna.
- Inserte la aguja en la piel en un ángulo de 90 grados.



- Inyecte el contenido de la jeringa en el espacio de unos cuantos segundos y luego retire la aguja.

## Paso 5

- Deseche la aguja y la jeringa en un contenedor para objetos punzocortantes.
- Aplique presión en el sitio de la inyección con una toallita impregnada en alcohol durante dos minutos como mínimo para evitar el sangrado o los moretones.



## ¿Qué efectos secundarios podría tener?

Los efectos secundarios **más comunes** son dolor y moretones.

Los efectos secundarios **menos comunes** (es más probable que aparezcan con el uso prolongado) son:

- Bultos duros en el pene
- Curvatura del pene

Un efecto secundario grave, pero raro, es el priapismo (una erección que dura más de 2 horas). Si eso ocurre:

- Tome 120 mg de pseudoefedrina por vía oral. Ese medicamento se vende sin receta, pero debe preguntar en la farmacia por este ya que se guarda detrás el mostrador.
- Si los síntomas continúan 1 hora después de haber tomado pseudoefedrina, llame a su médico y diríjase a la sala de emergencia.

## ¿A quién puedo llamar si tengo preguntas sobre este medicamento?

Comuníquese con Intermountain Homecare & Hospice al 800-527-1118 o al 385-887-6000, y pida hablar con la farmacia.

## ¿Por qué no funcionó Tri-mix?

Hay dos motivos principales por los cuales la inyección no funcionó en su caso. Es posible que:

- **Haya puesto la inyección de Tri-mix en el sitio equivocado:** Revise las instrucciones de la inyección en la página 1.
- **La dosis fue inadecuada:** Comuníquese con su médico para consultar si la dosis o la mezcla del medicamento debe cambiarse.

## ¿Cuándo debería llamar a mi médico?

Comuníquese con su médico si piensa dejar de usar el medicamento, O BIEN, cuando tenga:

- Preguntas sobre cómo tomar el medicamento
- Una reacción inadecuada
- Efectos secundarios molestos
- Síntomas de priapismo

## Notas

---

---

---

---

---

Contenido creado y aprobado por Intermountain Homecare & Hospice

Tri-mix Therapy for Erectile Dysfunction

Intermountain Health cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.

©2013-2024 Intermountain Health. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema médico o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. FSHC024S - 12/24 (Last reviewed - 02/23) (Spanish translation by CommGap)