

Minidosis de glucagón

¿Qué es una minidosis de glucagón?

Una minidosis de glucagón es una pequeña dosis de la hormona glucagón. Se usa para tratar los niveles bajos de glucosa en sangre, también llamada **hipoglucemia**. El glucagón ayuda al cuerpo a usar glucosa (azúcar) y grasa.

Debe darle a su niño minidosis de glucagón cuando esté despierto y alerta, pero cuando su BG esté por debajo de 70 mg/dl. Esto puede suceder cuando su niño:

- Está enfermo del estómago y no pueda retener la comida o las bebidas con carbohidratos
- No coopere y no coma

¿Cómo administro las minidosis de glucagón?

- 1 Prepare el glucagón siguiendo las instrucciones del kit de emergencia GlucaGen® o glucagón de su niño. Ambos se pueden guardar en el refrigerador y se conservan por 24 horas después de mezclarlos.
- 2 Con una jeringa de insulina, extraiga 1 unidad de glucagón por cada año de vida. (Vea el cuadro de dosificación a la derecha). No administre más de 15 unidades en la primera dosis.
- 3 Inyecte el glucagón del mismo modo que inyectaría insulina.
- 4 Verifique la BG de su hijo en 20 minutos. Si permanece por debajo de 70 mg/dl, **duplique la dosis** y administre otra inyección con la misma cantidad. Verifique la BG de su niño pasados 20 minutos. Si permanece por debajo de 70mg/dL, repita este paso.
- 5 **Si la BG de su niño permanece por debajo de 70mg / dL después de 3 dosis dobles, o si su niño se vuelve somnoliento, inconsciente o tiene una convulsión, administre la dosis estándar de glucagón y llame al 911.**

Kit de glucagón



Kit de GlucaGen

Para preparar el glucagón o GlucaGen, siga las instrucciones del kit que le recetó el médico de su niño. Si no tiene uno, pídale de inmediato una receta al médico de su niño.

Tabla de dosificación

Edad	Dosis (en unidades)	Edad	Dosis (en unidades)
Menor de 2 años	2	9 años	9
2 años	2	10 años	10
3 años	3	11 años	11
4 años	4	12 años	12
5 años	5	13 años	13
6 años	6	14 años	14
7 años	7	15 años	15

Mini-Dose Glucagon