

Efectos secundarios de los medicamentos comunes administrados después del parto

Su médico ha recomendado medicamentos para ayudarlo a mejorarse después del nacimiento de su bebé. Muchos medicamentos comunes pueden causar efectos secundarios (reacciones no previstas en el cuerpo). En la siguiente tabla se enumeran los nombres de los medicamentos junto a sus efectos secundarios. Mientras está en el hospital, hable con su enfermera acerca de cualquier efecto secundario que usted tenga. Después de retirarse del hospital, **comuníquese con su médico de inmediato** si usted presenta alguno de los efectos secundarios graves enumerados para su medicamento. Otros efectos secundarios graves podrían ocurrir. Si presenta síntomas diferentes de los que se mencionan aquí, o si tiene alguna inquietud acerca de sus medicamentos, hable con su equipo médico.

Nota: todos los medicamentos pueden producir reacciones alérgicas. Consiga atención médica de inmediato si:

- Tiene dificultad para respirar
- Tiene erupción en la piel o urticaria

Si tiene alguno de los efectos secundarios graves que se enumeran con su medicamento, comuníquese con su médico de inmediato.

Uso	Medicamento: nombre genérico (marca)	Efectos secundarios comunes	Efectos secundarios graves (comuníquese con su enfermera de inmediato)
Alivio del dolor sin opioides Alivia el dolor leve	• acetaminofeno (Tylenol)	Náuseas, vómitos,	Reacción alérgica grave que incluye erupción cutánea, comezón o urticaria, hinchazón de la cara, labios o lengua; orina oscura (pis); somnolencia extrema; piel amarilla; heces de colores claros (popós)
Alivio del dolor con opioides	• fentanilo • hidromorfona (Dilaudid) • hidrocodona + acetaminofeno (Norco, Lortab) • morfina • oxicodona • oxicodona + acetaminofeno (Percocet)	Estreñimiento, mareos, somnolencia, boca o garganta seca, dolor de cabeza, comezón, náuseas o vómitos	Reacción alérgica grave que incluye erupción cutánea, comezón o urticaria, hinchazón de la cara, labios o lengua; orina oscura (pis); somnolencia extrema; piel amarilla; heces (popós) de colores claros
Antiinflamatorio Alivia el dolor leve o moderado y los cólicos, reduce la hinchazón	• ibuprofeno (Motrin, Advil) • naproxeno (Aleve, Anaprox, Naprosyn) • ketorolaco (Toradol)	Mareos, gases, dolor de cabeza, acidez estomacal, náuseas, malestar estomacal	Reacción alérgica grave, dolor de pecho intenso, dolor de estómago intenso, heces (popós) con sangre u oscuras y alquitranadas, vómitos que parecen sangre o posos de café

Uso	Medicamento: nombre genérico (marca)	Efectos secundarios comunes	Efectos secundarios graves (comuníquese con su enfermera de inmediato)
Alivio del dolor sin opioides Alivia el dolor moderado a severo que no se puede aliviar con otros medicamentos	gabapentina (Neurontin)	Visión borrosa, mareos, somnolencia, fatiga, pérdida de coordinación, náuseas o vómitos, hinchazón en las extremidades, debilidad	Reacción alérgica grave que incluye erupción cutánea, comezón o urticaria, hinchazón de la cara, labios o lengua; dificultad para respirar; reacción cutánea grave; pensamientos de suicidio o autolesión
Alivio del dolor de la piel o superficie vaginal Alivia el dolor y la hinchazón en el área vaginal	- benzocaína (Dermoplast) - dibucaína (Nupercainal) - hidrocortisona (Anusol) - hamamelis (Tucks)	Ardor leve, sequedad, comezón, o irritación en el área donde se ha aplicado el medicamento	Reacción alérgica grave que incluye erupción cutánea en toda la piel, comezón o urticaria
Cuidado intestinal Previene o alivia el estreñimiento	- bisacodilo (Docolax) - docusato (Colace) - magnesium hydroxide (milk of magnesia) - polietilenglicol 3350 (Miralax) - sen/docusato (Sen -S)	Dolor de estómago o cólicos, diarrea, gases	Reacción alérgica grave, diarrea grave
Alivio de la comezón Alivia la comezón, la cual puede ser un efecto secundario de los medicamentos opioides para el dolor	- cetirizina (Zyrtec) - difenhidramina (Benadryl) - nalbufina (Nubain)	Somnolencia, mareos, ojos secos, boca o garganta seca, dolor de cabeza, náuseas, vómito, sudor o humedad Por lo general, la cetirizina se tolera muy bien y tiene pocos efectos secundarios	Reacción alérgica grave, problemas para respirar, aumento de la frecuencia cardíaca, incapacidad para orinar (hacer pis) o sueño extremo
Control de las convulsiones Previene las convulsiones	sulfato de magnesio	Somnolencia o fatiga, enrojecimiento (cara o piel enrojecida), sudor o calor, presión arterial baja, náusea	Reacción alérgica grave, dolor de pecho intenso, dificultad para respirar, habla arrastrada, debilidad grave
Control del sangrado Ayuda a controlar y reducir hemorragias graves provenientes del útero	- carboprost (Hemabate) - metilergonovina (Methergine) - misoprostol (Cytotec) - oxitocina (Pitocin) - ácido tranexámico o "TXA" (Cyklokapron)	Diarrea, mareos, boca o garganta seca, aumento de la frecuencia cardíaca, sofocos o enrojecimiento (cara o piel enrojecida), náuseas, vómitos, calambres musculares o uterinos	Reacción alérgica grave, coágulo de sangre, dificultad para respirar, presión arterial alta, dolor de cabeza intenso, convulsiones, reacción cutánea grave, accidente cerebrovascular, calambres uterinos intensos, visión borrosa o modificada

Uso	Medicamento: nombre genérico (marca)	Efectos secundarios comunes	Efectos secundarios graves (comuníquese con su enfermera de inmediato)
Medicamentos para dormir Ayudan a empezar y continuar el sueño	• zolpidem (Ambien)	Mareos, somnolencia de larga duración, dolor de cabeza, sensación de desvanecimiento	Reacción alérgica grave, que incluye la hinchazón de la cara, los labios, o la lengua; dificultad para respirar, confusión; alucinaciones; hábitos del sueño inusuales; pensamientos de suicidio o autolesión, cambios en la visión
Antibióticos Ayuda a prevenir o tratar las infecciones bacterianas en la madre y el bebé	• ampicilina • ampicilina/sulbactam (Unasyn) • azitromicina (Zithromax) • cefazolina (Ancef, Kefzol) • ceftriaxona (Rocephin) • clindamicina (Cleocin) • ertapenem (Invanz) • eritromicina • gentamicina • nitrofurantoína (Macrobid) • piperacilina/tazobactam (Zosyn) • vancomicina	Diarrea, dolor de cabeza, náuseas, malestar o dolor de estómago, vómitos Específico de clindamicina: sabor metálico	Reacción alérgica grave que incluye erupción cutánea, dificultad para respirar; diarrea severa, disminución significativa de la micción (no orinar lo suficiente) Específico de gentamicina: cambios en la audición Específico de vancomicina: cambios en la audición, erupción roja extendida en la parte superior del cuerpo, mareos importantes, presión arterial baja
Alivio de las náuseas Alivia la náusea y el dolor, reduce la ansiedad	• haloperidol (Haldol) • metoclopramida (Reglan) • ondansetrón (Zofran) • proclorperazina (Compazine) • prometazina (Phenergan) • escopolamina (TransdermScop)	Confusión, mareos, somnolencia, ojos y boca seca, dolor de cabeza Específico de escopolamina: agitación, pérdida de la memoria, enrojecimiento, piel irritada donde se colocó el parche, visión borrosa	Reacción alérgica grave, somnolencia excesiva, movimientos del cuerpo incontrolables Específico de inyección prometazina: dolor o molestia cerca del área donde se administró el medicamento Específico de escopolamina: confusión extrema o desorientación, cambios de humor o alucinaciones graves, problemas al orinar (hacer pis) o dolor grave al orinar, cambios en la visión graves

Uso	Medicamento: nombre genérico (marca)	Efectos secundarios comunes	Efectos secundarios graves (comuníquese con su enfermera de inmediato)
Alivio de los gases Previene y reduce los gases estomacales	• simeticona (Gas-X) • hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, simeticona (Maalox, Mylanta)	Generalmente hay pocos efectos secundarios, pero puede haber estreñimiento o diarrea leve, calambres estomacales, decoloración de las heces (popó), sabor a tiza desagradable	Dolor de estómago severo
Alivio de la acidez estomacal Previene y reduce el gas estomacal	• carbonato de calcio (Mylanta, Tums) • famotidina (Pepcid) • hidróxido de magnesio (leche de magnesia) • pantoprazol (Protonix) • citrato de sodio y ácido cítrico (Bicitra)	Estreñimiento o diarrea, gases, dolor de cabeza, náusea, dolor de estómago, vómito	Reacción alérgica grave, reacción cutánea grave
Protección de la piel Proporciona alivio en las heridas o pezones rajados	• lanolina (Lan-O-Soothe)	Se tolera muy bien, sin efectos secundarios comunes	
Control de la presión arterial alta Reduce la presión arterial	• hidralazina • labetalol • nifedipina	Mareos, enrojecimiento (cara o piel enrojecida), dolor de cabeza, aturdimiento, calambres musculares, náuseas, cansancio, vómitos. Específico de labetalol: hormigueo en la piel	Reacción alérgica grave (incluida hinchazón de la cara, labios o lengua), dificultad para respirar, dolor de pecho intenso, latidos cardíacos rápidos, reacción cutánea grave, dolor de estómago intenso
Suplementos de hierro Mejora los niveles de hierro los cuales pueden bajar durante el embarazo o después de una hemorragia	• Ferodan, sulfato ferroso: administrado por vía oral (por vía oral u oral) • Venofer, hierro sacarosa: administrado por vía intravenosa (en las venas o IV)	Específico del producto de hierro oral: estreñimiento, heces oscuras (popó), gases, acidez de estómago, dolor o malestar estomacal Hierro intravenoso específico del producto: diarrea, dolor de cabeza	Reacción alérgica grave (incluyendo hinchazón de la cara, labios o lengua, dificultad para respirar), dolor de pecho intenso, dolor de estómago intenso o malestar