

Hablemos Acerca De...

Cuidado dental después de un procedimiento

El cuidado dental es una parte normal de la infancia. Es posible que a su hijo le hayan realizado empastes, extracciones, limpiezas dentales, tratamientos con flúor, coronas o fundas dentales. Después de los procedimientos dentales, tendrá que ayudar al niño a cuidar de su dentadura.



¿Qué puedo esperar si al niño le hacen un tratamiento con sedación o anestesia?

El dentista puede administrarle al niño óxido nitroso (llamado a menudo gas hilarante) para ayudarlo a que se relaje durante el tratamiento dental. Este es seguro y su finalidad no es dormir al niño. En cambio, el gas debe hacer que el niño se sienta cálido, relajado y cómodo. El niño puede tener náuseas después de la desaparición del efecto del óxido nitroso, pero esto no es frecuente.

El dentista puede usar un medicamento para adormecer la boca del niño cuando le saca un diente o le hace otros tratamientos dentales. Este medicamento le adormece la boca al niño de 2 a 4 horas. Vigile de cerca al niño y asegúrese de que no se muerda o rasguñe las mejillas, los labios o la lengua mientras están adormecidos. Algunos niños no

entienden esta sensación y pueden llegar a ponerse molestos o a confundirla con el dolor. Puede decirle al niño que la “sensación extraña” desaparecerá al cabo de unas 2 horas.

¿Tendrá el niño dolor o hinchazón después del tratamiento dental?

Es normal que haya un poco de hinchazón y dolor después de algunos tratamientos dentales. Alterne paracetamol (como Tylenol™) e ibuprofeno (como Motrin™) durante el día para ayudar a aliviar el dolor del niño. Llame al dentista si el niño tiene mucho dolor e hinchazón que no disminuyen.

¿Qué puedo esperar si a mi niño le sacan un diente?

Si al niño le sacan un diente (también llamado extracción), el dentista puede colocar compresas de gasa en la boca del niño para controlar el sangrado normal cerca del lugar. Generalmente, el niño no tendrá que tomar analgésicos ni antibióticos después de una extracción. No permita que el niño succione de una pajilla ni beba refrescos durante 48 horas después de la extracción de un diente, ya que esto puede aumentar el sangrado.

¿Qué puedo esperar si el niño tiene empastes o fundas dentales?

Después de los empastes o las coronas (fundas), los dientes del niño pueden estar sensibles al calor, al frío o a la presión durante un tiempo corto. Pueden pasar varias semanas hasta la sensación en los dientes con empastes o fundas se normalice. El tejido de la encía que rodea al diente también puede estar irritado. Esto es normal y desaparecerá con el tiempo.

