

# Hablemos Acerca De...

## Pancreatitis

### ¿Qué es la pancreatitis?

La pancreatitis ocurre cuando el páncreas (órgano que ayuda al cuerpo a digerir los alimentos) se irrita e inflama, y deja de funcionar correctamente.

El páncreas produce dos enzimas (químicos especiales que ayudan a descomponer los alimentos): la amilasa y la lipasa. Normalmente, estas enzimas funcionan después de salir del páncreas. Si su niño tiene pancreatitis, las enzimas empiezan a trabajar mientras aún están en el páncreas. Como resultado, empiezan a inflamar el páncreas.

### ¿Cuáles son los síntomas de la pancreatitis?

El síntoma más común de la pancreatitis es un dolor fuerte que, por lo general, empieza o empeora después de comer. Puede aparecer repentinamente o ir aumentando gradualmente.


Otros síntomas de la pancreatitis pueden incluir:

- Náusea (sentir ganas de vomitar)
- Vómito
- Fiebre o escalofríos
- Dolor estomacal
- Letargo, o sensación de mucho cansancio
- Irritabilidad
- Sensación de aceleración del corazón



### ¿Dónde puedo obtener más información?

Para aprender más sobre la pancreatitis, consulte el sitio web de la National Pancreas Foundation ([pancreasfoundation.org](http://pancreasfoundation.org)). Haga clic en la pestaña **Patient Information (Información para el paciente)** y seleccione **Pediatric Pancreatitis (Pancreatitis pediátrica)**.



El páncreas es un órgano que se encuentra detrás del estómago. Produce químicos importantes para el cuerpo.

### ¿Cuáles son las causas de la pancreatitis?

La pancreatitis puede producirse por:

- Traumatismo (como un golpe o un impacto) en el páncreas
- Obstrucción en el conducto pancreático (tubo pequeño que permite que las enzimas fluyan hacia los intestinos)
- Enfermedad o infección grave
- Malformación del páncreas

Su niño tiene más probabilidades de tener pancreatitis si tiene antecedentes familiares de la enfermedad.

### ¿Cómo se diagnostica la pancreatitis?

Generalmente, la pancreatitis se diagnostica a través de una prueba de sangre que mide la cantidad de amilasa y lipasa en la sangre. Los niños con pancreatitis tienen en la sangre una cantidad de estas dos enzimas mucho más elevada que lo normal.

Para tomar imágenes detalladas del páncreas de su niño, el médico puede ordenar un ultrasonido, una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés).

