

# Hablemos Acerca De...

## La ribavirina

### ¿Qué es la ribavirina?

La ribavirina es un medicamento antivírico (un medicamento que mata a los virus) que se usa para tratar infecciones graves del virus respiratorio sincitial (VRS), la influenza tipos A y B, adenovirus, los pacientes recientemente trasplantados y pacientes inmunodeficientes e inmunodeprimidos.

### ¿Cómo recibe un niño la ribavirina?

Un terapeuta respiratorio le dará a su hijo el tratamiento con ribavirina. Su hijo recibirá la ribavirina con un equipo especial que hace una niebla fina. Este equipo se llama “generador de partículas pequeñas en aerosol” (SPAG, por sus siglas en inglés). La niebla fina va directamente a los pulmones. Su hijo usará una máscara especial mientras recibe el tratamiento y respirará el vapor fino con esta máscara.

### ¿Qué sucede antes de un tratamiento con ribavirina?

Su hijo recibirá un tratamiento respiratorio con albuterol 15 minutos antes de recibir el tratamiento con ribavirina. La ribavirina puede provocar broncoespasmos (como un ataque de asma), y el albuterol previene los broncoespasmos.

### ¿Con qué frecuencia mi hijo recibirá los tratamientos de ribavirina?

Los tratamientos de ribavirina se dan 3 veces al día. El tratamiento durará 2 horas y luego habrá un descanso de 6 horas antes del próximo tratamiento. Su hijo recibirá 2 tratamientos en la noche y 1 tratamiento durante el día. Esto es para que su hijo pueda dormir por la noche y pueda comer durante el día.

### ¿Tiene la ribavirina efectos secundarios?

Los efectos secundarios pueden incluir:

- Puede disminuir la presión arterial
- Dolor de cabeza

- Sarpullido
- Irritación de la piel
- Anemia
- Infección de los ojos
- Broncoespasmo (por ejemplo, un ataque de asma)
- Irritación de la nariz y la garganta
- Paro cardíaco

### ¿Hay alguna precaución especial cuando mi hijo recibe ribavirina?

- Si una persona tiene asma, no debe estar en la sala mientras su hijo recibe ribavirina, ya que puede causar que la persona tenga broncoespasmos (como un ataque de asma).
- Si una mujer está embarazada, o está en edad que podría estar embarazada, o está dando pecho, ella no debería estar en la habitación cuando se administra la ribavirina.
- El equipo médico colocará a su hijo en una “habitación con presión negativa”. Se trata de una habitación en la que el flujo de aire se expulsa hacia el exterior. Esto limpia el aire y envía la ribavirina afuera de la habitación después de que su hijo reciba el tratamiento.
- Cuando su hijo está recibiendo el tratamiento con ribavirina, todos en la sala deben usar una bata, guantes y mascarilla.
- Los profesionales médicos tales como el personal de enfermería, personal de cuidados respiratorios y los médicos utilizarán gafas mientras su hijo esté recibiendo terapia de ribavirina.
- Ni su hijo ni los visitantes deben usar lentes de contacto cuando él esté recibiendo tratamiento con ribavirina.

### ¿Qué debo hacer si tengo preguntas?

La enfermera de su hijo, el terapeuta respiratorio o un médico pueden contestar cualquier pregunta que usted tenga sobre los tratamientos con ribavirina.