

# Hablemos Acerca De...

## Fenol para músculos espásticos

### ¿Qué es el fenol y cómo funciona?

El fenol es un medicamento que afloja los músculos para que no estén demasiado tensos. Por lo general, el médico administra inyecciones de fenol con una aguja pequeña dentro del músculo. El fenol funciona de inmediato y puede durar hasta seis meses. Por lo general, el fenol se usa para ayudar a soltar los músculos más grandes, tales como el músculo del muslo.



### ¿Cuáles son los beneficios de las inyecciones de fenol?

Las inyecciones de fenol tratan la espasticidad. La espasticidad se produce cuando los músculos se tensan más de lo que deberían. Esto dificulta cosas como moverse, hablar o caminar. Aflojar los músculos con el fenol puede hacer que su niño se sienta más cómodo y ayuda a que sus músculos se muevan mejor.

Uso del fenol como tratamiento temporal para los músculos espásticos. El medicamento funciona mejor si su hijo también recibe otros tratamientos, tales como una férula, yeso, estiramiento o posicionamiento especial.

### Riesgos de utilizar fenol

El fenol tiene un riesgo bajo. Los efectos secundarios incluyen:

- Sangrado
- Hematomas (moretones)
- Molestias leves en el lugar donde su niño recibió las inyecciones.
- Un nudo muscular pequeño que se forma en el músculo

### ¿Cómo le administrarán el fenol a mi niño?

El médico de su niño inyectará el fenol en el lugar donde el nervio entra en el músculo. El médico estimula el músculo con una máquina pequeña para encontrar el lugar exacto para inyectar el fenol. Con frecuencia, se inyecta el fenol en unos pocos lugares en cada músculo.

Puesto que las inyecciones de fenol pueden doler, el médico puede darle a su niño un medicamento para ayudarlo a dormir durante el procedimiento. Esto se llama sedación. Si su niño recibe sedación, el procedimiento tendrá lugar en el Centro de Procedimientos para Niños (CPC).

Un miembro del personal de CPC le llamará la tarde antes del procedimiento. Le dirá los alimentos y líquidos que su niño puede ingerir antes de ser sedado. Después de la sedación, su niño podría sentirse somnoliento durante un rato. El personal de CPC observará a su niño de cerca hasta que se despierte y esté listo para marcharse a casa.

En raras ocasiones, puede haber problemas con algún nervio pequeño. Si esto ocurre, las molestias pueden durar más tiempo. Pregunte al médico de su niño acerca del medicamento que puede tratar estas molestias.

