Hablemos
Acerca De…

Disminución gradual de los analgésicos opioides en el hogar

Es importante que lea y recuerde esta información. Esto le ayudará a mantener a su hijo a salvo y a saber cuándo es necesario llamar al médico de su hijo.

Los analgésicos opioides son medicamentos fuertes recetados para aliviar el dolor y el malestar. Los analgésicos opioides pueden administrarse por vía oral e intravenosa (IV, por sus siglas en inglés). Existen muchos tipos de estos medicamentos. Algunos de los analgésicos opioides más comunes son el fentanilo, la morfina y la metadona. La metadona se utiliza comúnmente para aliviar el dolor y las molestias de la abstinencia.

La abstinencia ocurre cuando una persona toma un analgésico (medicamento para el dolor) durante mucho tiempo y después la cantidad del medicamento es reducida drásticamente o suspendida. La abstinencia puede ser incómoda y puede requerir de la ayuda de un médico.

La disminución gradual de un medicamento es cuando la dosis se reduce lentamente y el tiempo entre las tomas del medicamento aumenta. La disminución gradual evita el dolor y las molestias de la abstinencia.

¿Por qué necesita mi hijo una disminución gradual de los analgésicos opioides?

Mientras su hijo estuvo en el hospital necesitó determinados medicamentos para aliviar o evitar el dolor. Fue necesario administrarle estos medicamentos durante un período largo de tiempo. Es posible que un niño necesite una disminución gradual de los analgésicos opioides si los medicamentos fueron administrados por más de una semana. La disminución gradual de los analgésicos opioides evitará el dolor, la irritación y la angustia asociados a la suspensión de este medicamento.

¿Cuánto tiempo necesitará mi hijo estar en una disminución gradual de los analgésicos opioides?

Cada niño tiene necesidades específicas. El médico planeará cuidadosamente la disminución gradual para su hijo. El médico de su hijo se asegurará de que su hijo tenga una disminución gradual de los analgésicos opioides segura y eficaz. La disminución gradual puede tener una duración de tan sólo unos días o de hasta 2 ó 3 semanas. Su médico o enfermera podrán informarle cuánto tiempo puede prever que dure la disminución gradual.

¿Son seguros los analgésicos opioides?

El médico le recetará dosis del medicamento seguras y eficaces a su hijo. Estas medidas le ayudarán a evitar problemas mientras se lleva a cabo la disminución gradual de los analgésicos opioides:

- Dele el medicamento a su hijo exactamente como lo haya recetado el médico.
- No comparta el medicamento con ninguna otra persona.
- No cambie la cantidad administrada del medicamento, a menos que reciba instrucciones específicas del médico de su hijo.
- No cambie el horario de administración del medicamento, a menos que reciba instrucciones específicas del médico de su hijo.

¿Cuáles son las señales de la abstinencia?

Algunas de las señales de la abstinencia son estornudos, bostezos, diarrea, sudoración, fiebre,

aumento del tono muscular, convulsiones, irritabilidad y temblores. Si su hijo presenta estos síntomas, llame al médico de su hijo. Es importante que el médico de su hijo decida si se trata de una infección que requiera de atención médica o de abstinencia que pueda necesitar tratamiento.

¿Cuáles son los síntomas de una sobredosis?

Una sobredosis se presenta cuando una persona toma una dosis excesiva de un analgésico opioide. Algunos síntomas de una sobredosis son:

- Su hijo presenta dificultad para despertar
- Su hijo duerme en exceso
- Su hijo se nota confundido
- Su hijo presenta dificultad para respirar

Si nota cualquiera de estos síntomas, llame a su médico de inmediato. Si su hijo presenta dificultad para respirar, llame al 911.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis del medicamento o vomita?

Si su hijo no toma una dosis del medicamento o vomita, no le dé otra dosis del medicamento. Si su hijo vomita, es imposible saber la cantidad de medicamento que fue administrada o la cantidad que tenga en su organismo.

Lleve un registro y anote cada vez que su hijo tome el medicamento. Así podría ser más fácil recordar la dosis del medicamento.

Si tiene más preguntas, llame al médico de cabecera de su hijo.

¿Cuándo debo acudir o llamar al médico de mi hijo?

Llame al médico de su hijo en cualquier momento en que se sienta inquieto sobre la salud de su hijo o tenga alguna pregunta sobre la disminución gradual de los analgésicos opioides. Un conjunto de documentos llamado Módulo de información del proveedor de la abstinencia de los analgésicos opioides se incluyó en sus documentos del alta médica. Si su hijo necesita atención médica, lleve consigo estos documentos y entrégueselos al médico de su hijo.

Intermountain
Primary Children's
Medical Center
The Child First and Always®

© 2011 Intermountain Healthcare, Primary Children's Medical Center. Toda la información contenida en las series ***Hablemos Acerca de . . .*** tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de cuidados de la salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Pediatric Education Services, 801.662.3500 | Translation 09/11, LTA521090063 | Opioid taper at home (06/11)