

Consulte el envase del medicamento para ver las indicaciones y advertencias completas. Siga siempre las indicaciones de su pediatra. Tomar demasiado acetaminofeno puede causar problemas.

Llame a su pediatra inmediatamente si un niño menor de 3 meses tiene fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más (a menos que el niño haya recibido vacunas hoy).

Siga estos consejos para darle a su niño la dosis correcta de acetaminofeno:

- Use el peso del niño y la tabla a continuación para seleccionar la dosis correcta.
- No administre acetaminofeno durante más de 7 días consecutivos sin hablar con su pediatra.
- Puede administrar las dosis que se indican en la tabla a continuación cada 4 horas, si es necesario. Administre la cantidad mínima de dosis necesarias para ayudar a que el niño se sienta mejor. **No administre más de 5 dosis en el lapso de 24 horas.**
- Muchos analgésicos con y sin receta médica contienen acetaminofeno. Lea las etiquetas y **no le dé a su niño más de 1 medicamento que contenga acetaminofeno** sin antes hablar con el médico de su niño.

Nota: el acetaminofeno líquido solía estar disponible en concentraciones diferentes. Esta guía es para la concentración de **160 mg por 5 mL**. Si tiene una concentración diferente, siga las indicaciones del fabricante o de su pediatra.



Guía de dosificación de acetaminofeno (Tylenol)

Peso (en libras)	Dosis	Jarabe líquido para bebés (use la jeringa proporcionada)	Jarabe líquido para niños (use la cuchara proporcionada)	Tabletas masticables o solubles para niños	Tabletas masticables o solubles para niños mayores
Concentración		160 mg/5 mL	160 mg/5 mL	80 mg	160 mg
9 a 11 lb	60 mg	1.875 mL			
12 a 17 lb	80 mg	2.5 mL	2.5 mL		
18 a 23 lb	120 mg	3.75 mL	3.75 mL		
24 a 35 lb	160 mg	5.0 mL	5.0 mL	2 tabletas	
36 a 46 lb	240 mg		7.5 mL	3 tabletas	
47 a 58 lb	320 mg		10.0 mL	4 tabletas	2 tabletas
59 a 70 lb	400 mg		12.5 mL	5 tabletas	2½ tabletas
más de 70 lb	480 mg		15.0 mL	6 tabletas	3 tabletas

Guía de dosificación pediátrica:

Ibuprofeno (Motrin, Advil)

Consulte el envase del medicamento para ver las indicaciones y advertencias completas. Siga siempre las indicaciones de su pediatra. Tomar demasiado ibuprofeno puede causar problemas.

Llame a su pediatra inmediatamente si su niño menor de 3 meses tiene fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más.

Si a su niño le van a hacer una cirugía dentro de 1 semana, **no le dé ibuprofeno**. Este medicamento puede aumentar levemente el riesgo de sangrado.

Siga estos consejos para darle a su niño la dosis correcta de ibuprofeno:

- Revise el frasco para determinar la concentración que tiene. El ibuprofeno líquido está disponible en diferentes concentraciones.
- Use el peso del niño y la tabla a continuación para seleccionar la dosis correcta.



- **No administre ibuprofeno durante más de 7 días** seguidos sin hablar con su pediatra.
- **No le dé ibuprofeno a niños menores de 6 meses.**
- **Puede administrar las dosis que se indican en la tabla a continuación cada 6 horas, si es necesario.** Administre la cantidad mínima de dosis necesaria para ayudar a que el niño se sienta mejor. **No administre más de 4 dosis en el lapso de 24 horas.**
- **Administre la cantidad mínima de medicamento necesaria para ayudar a que el niño se sienta mejor.** La mitad de la dosis recomendada puede ser eficaz.

Guía de dosificación de ibuprofeno (Motrin, Advil)

Peso (en libras)	Dosis (hasta)	Gotas para niños (use el gotero proporcionado)	Líquido infantil (use la jeringa o cuchara proporcionada)	Tabletas masticables	Tabletas masticables para niños mayores	Tabletas fáciles de tragar para niños mayores	Tabletas regulares para adultos
Concentración		50 mg / 1.25 mL	100 mg / 5 mL	50 mg	100 mg	100 mg	200 mg
11 a 16 lb	50 mg	1.25 mL	2.5 mL				
17 a 21 lb	75 mg	1.875 mL	3.75 mL				
22 a 32 lb	100 mg		5.0 mL	2 tabletas	1 tableta		
33 a 43 lb	150 mg		7.5 mL	3 tabletas	1½ tabletas		
44 a 54 lb	200 mg		10 mL	4 tabletas	2 tabletas	2 tabletas	
55 a 65 lb	250 mg		12.5 mL	5 tabletas	2½ tabletas	2½ tabletas	1 tableta
66 a 87 lb	300 mg		15 mL	6 tabletas	3 tabletas	3 tabletas	1–1½ tabletas
más de 88 lb	400 mg		17.5 mL	8 tabletas	4 tabletas	4 tabletas	2 tabletas

Pediatric Dosing Guide

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.

© 2015–2018 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de cuidados de la salud. Hay más información disponible en intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications CLD003S-01/18 (Last reviewed - 03/17) (Spanish translation 01/18 by inWhatLanguage)