

Consulte el paquete del medicamento para las instrucciones y advertencias completas, y siempre siga las instrucciones de su pediatra. Tomar demasiado acetaminofeno puede causar problemas.

Llame a su pediatra de inmediato si un niño menor de 3 meses de edad tiene una fiebre de 100.4°F (38°C) o más alta (a menos que su niño haya recibido sus vacunas hoy).

Siga estas recomendaciones para darle la dosis correcta de acetaminofeno a su niño:

- **Utilice el peso de su niño para elegir la dosis correcta.**
- **No le dé acetaminofeno por más de 7 días seguidos** sin consultar a su pediatra.
- Usted puede darle la dosis indicada en la gráfica a continuación cada 4 horas, si es necesario. Dele la mínima cantidad de la dosis necesaria para ayudar a que su niño se sienta mejor. **No le dé más de 5 dosis en 24 horas.**
- El acetaminofeno se encuentra en varios analgésicos de venta libre y recetados. Lea las etiquetas, y **no le dé a su niño más de un medicamento que contenga acetaminofeno** sin consultarlo con su médico.

Nota: El acetaminofeno líquido solía estar disponible en diferentes concentraciones. Esta guía es para la concentración de **160 mg por 5 mL** concentración. Si usted tiene una concentración diferente, siga las instrucciones del fabricante o las de su pediatra.



Acetaminofeno (Tylenol) Guía de Dosificación

Peso (en libras)	Dosis	Jarabe líquido para bebés (use la jeringa incluida)	Jarabe líquido para niños (use la cuchara incluida)	Tabletas masticables o desbaratables para niños	Tabletas masticables o fundibles de fuerza para niños
Concentración		de 160 mg/5 mL	de 160 mg/5 mL	80 mg	160 mg
9–12 lbs	40 mg	1.25 mL			
13–16 lbs	60 mg	1.875 mL			
17–26 lbs	80 mg	2.5 mL	2.5 mL (½ cucharadita)		
27–34 lbs	120 mg	3.75 mL	3.75 mL (¾ cucharadita)		
35–52 lbs	160 mg	5.0 mL	5.0 mL (1 cucharadita)	2 tabletas	
53–69 lbs	240 mg		7.5 mL (1½ cucharaditas)	3 tabletas	
70–87 lbs	320 mg		10 mL (2 cucharaditas)	4 tabletas	2 tabletas
88–105 lbs	400 mg		12.5 mL (2½ cucharaditas)	5 tabletas	2½ tabletas
106+ lbs	480 mg		15 mL (3 cucharaditas)	6 tabletas	3 tabletas

Consulte el paquete del medicamento para las instrucciones y advertencias completas, y siempre siga las instrucciones de su pediatra. Tomar demasiado ibuprofeno puede causar problemas.

Llame a su pediatra de inmediato si un niño menor de 3 meses de edad tiene una fiebre de 100.4°F (38°C) o más alta.

No le dé ibuprofeno a su niño si va a tener una cirugía dentro de una semana. Puede aumentarle ligeramente el riesgo de sangrado.

Siga estas recomendaciones para darle a su niño la dosis correcta de ibuprofeno:

- Revise el frasco para determinar cual concentración tiene. El ibuprofeno líquido está disponible en concentraciones diferentes.
- Utilice el peso de su niño para elegir la dosis correcta.



- **No le dé ibuprofeno por más de 7 días** seguidos sin consultarlo con su pediatra.
- **No les dé ibuprofeno a niños menores de 6 meses.**
- **Le puede dar la dosis indicada en la gráfica a continuación cada 6 horas, si es necesario.** Dele las dosis mínimas necesarias para ayudar a que su niño se sienta mejor. **No le dé más de 4 dosis en 24 horas.**
- **Dele la menor cantidad de medicamento necesario para ayudar a que su niño se sienta mejor.** La mitad de la dosis recomendada puede ser efectiva.

Ibuprofeno (Motrin, Advil) Guía de dosificación

Peso (en libras)	Dosis (hasta)	Gotas para niños (use el gotero incluido)	Líquido infantil (use la jeringa o cuchara incluida)	Tabletas masticables	Masticables para niños	Tabletas fáciles de tragar para niños	Tabletas para adultos
Concentración		de 50 mg/1.25 mL	de 100 mg/5 mL	50 mg	100 mg	100 mg	200 mg
11–16 lbs	50 mg	1.25 mL (1 gotero ó 2/3 jeringa)	2.5 mL (1/2 cucharadita)				
17–21 lbs	75 mg	1.875 mL	3.75 mL (3/4 cucharadita)				
22–32 lbs	100 mg		5.0 mL (1 cucharadita)	2 tabletas	1 tableta		
33–43 lbs	150 mg		7.5 mL (1 1/2 cucharaditas)	3 tabletas	1 1/2 tabletas		
44–54 lbs	200 mg		10 mL (2 cucharaditas)	4 tabletas	2 tabletas	2 tabletas	
55–65 lbs	250 mg		12.5 mL (2 1/2 cucharaditas)	5 tabletas	2 1/2 tabletas	2 1/2 tabletas	1 tableta
66–87 lbs	300 mg		15 mL (3 cucharaditas)	6 tabletas	3 tabletas	3 tabletas	1–1 1/2 tabletas
88+ lbs	400 mg		17.5 mL (4 cucharaditas)	8 tabletas	4 tabletas	4 tabletas	2 tabletas

Pediatric Dosing Guide