

Tratamiento Tri-mix para la disfunción eréctil

Tri-mix contiene 3 medicamentos (alprostadil, fentolamina y papaverina) que trabajan juntos para elevar el flujo de sangre al pene para provocar una erección. Este tratamiento, el cual se administra como inyección, permite tener relaciones sexuales.

¿En qué casos se emplea Tri-mix?

Un médico suele solicitar Tri-mix cada vez que otros dispositivos o medicamentos no funcionan o provocan efectos secundarios.

¿Me dará resultados Tri-mix?

Tri-mix funciona en aproximadamente 9 de cada 10 pacientes. A diferencia de los medicamentos orales, las inyecciones de Tri-mix provocan una erección automática. La inyección puede aplicarse 5 minutos antes de tener relaciones sexuales y los efectos no deben durar más de una hora.

¿Cómo me aplico una inyección de Tri-mix por mi propia cuenta?

Se aplica Tri-mix en el pene con una aguja pequeña. Siga las siguientes instrucciones paso por paso.

Paso 1

- Tenga a mano toallitas impregnadas con alcohol, jeringa con aguja, medicamentos y un contenedor de objetos punzocortantes.
- Lávese las manos.




Paso 2

- Limpie la parte superior de goma del frasco con la toallita impregnada en alcohol.
- Llene la jeringa con una parte de aire igual a la dosis, inserte la aguja en la tapa de goma, llene la parte de aire y voltee el envase de cabeza.
- Llene la jeringa con medicamento hasta la dosis indicada.
- Golpee los lados de la jeringa para que las burbujas de aire se deslicen hacia arriba. Elimine las burbujas antes de usar.
- Retire la aguja del frasco y vuelva a tapar la aguja.

Paso 3


- Ubique el sitio de la inyección entre la base y la parte media del pene a las 9-11 o 1-3 en punto.



- Evite cualquier vena o arteria visible en la superficie.

Paso 4

- Limpie el sitio con una toallita impregnada en alcohol y espere a que se seque.
- Retire la tapa de la jeringa.
- Coloque la cabeza del pene en dirección al costado de la pierna.



- Inserte la aguja en la piel en un ángulo de 90 grados.
- Inyecte el contenido de la jeringa en el espacio de unos cuantos segundos y luego retire la aguja.

Paso 5

- Deseche la aguja y la jeringa en un contenedor para objetos punzocortantes.
- Aplique presión en el sitio de la inyección con una toallita impregnada en alcohol durante dos minutos como mínimo para evitar el sangrado o los moretones.



¿A quién puedo llamar si tengo preguntas sobre este medicamento?

Comuníquese con Intermountain Homecare & Hospice al 800-527-1118 o al 385-887-6000, y pida hablar con la farmacia.

¿Por qué no funcionó Tri-mix?

Hay dos motivos principales por los cuales la inyección no funcionó en su caso. Es posible que:

- **Haya puesto la inyección de Tri-mix en el sitio equivocado:** Revise las instrucciones de la inyección en la página 1.
- **La dosis fue inadecuada:** Comuníquese con su médico para consultar si la dosis o la mezcla del medicamento debe cambiarse.

¿Qué efectos secundarios podría tener?

Los efectos secundarios **más comunes** son dolor y moretones.

Los efectos secundarios **menos comunes** (es más probable que aparezcan con el uso prolongado) son:

- Bultos duros en el pene
- Curvatura del pene

Un efecto secundario grave, pero raro, es el priapismo (una erección que dura más de 2 horas). Si eso ocurre:

- **Tome 120 mg de pseudoefedrina por vía oral.** Ese medicamento se vende sin receta, pero debe preguntar en la farmacia por este ya que se guarda detrás el mostrador.
- **Si los síntomas continúan 1 hora** después de haber tomado pseudoefedrina, llame a su médico y diríjase a la sala de emergencia.



¿Cuándo debo llamar o visitar al médico?

Comuníquese con su médico si piensa dejar de usar el medicamento, **O BIEN**, cuando tenga:

- Preguntas sobre cómo tomar el medicamento
- Una reacción inadecuada
- Efectos secundarios molestos
- Síntomas de priapismo



Preguntas para el médico:

Tri-mix Therapy for Erectile Dysfunction

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.

© 2013 - 2017 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de cuidados de la salud. Hay más información disponible en intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications FSHC0245-05/17 (Last reviewed - 10/16) (Spanish translation 12/16 by Lingotek, Inc.)