

Hablemos Acerca De...

Colecistitis: inflamación de la vesícula biliar

¿Qué causa la colecistitis?

La colecistitis ocurre cuando la vesícula biliar se inflama (roja e hinchada). Con frecuencia, se produce por cálculos, objetos que parecen piedras que crecen por exceso de bilis o colesterol en la vesícula biliar. Los cálculos pueden tapan los conductos biliares, por medio de los cuales la bilis sale de la vesícula biliar. Cuando la bilis no puede salir de la vesícula biliar, se acumula y causa inflamación. Su niño también puede tener colecistitis si tiene cicatrización en los conductos biliares que bloquean el paso de la bilis o por un tumor en la vesícula biliar.

¿Cuáles son las señales de la colecistitis?


Su niño puede tener alguna de las siguientes señales de colecistitis, por lo general después de ingerir una comida abundante o grasosa:

- Dolor en la parte superior del abdomen que se pasa al hombro derecho o la espalda
- Náuseas
- Fiebre
- Vómitos
- Dolor en el abdomen cuando se toca

¿Cómo se diagnostica la colecistitis?

El proveedor de atención médica de su niño le preguntará acerca de sus síntomas e historial médico. Para detectar una colecistitis, su niño puede necesitar lo siguiente:

- Un ultrasonido de abdomen
- Una tomografía computarizada (una serie de imágenes del cuerpo de su niño)
- Pruebas de sangre



- Una gammagrafía hepatobiliar (HIDA, por sus siglas en inglés), que hace un seguimiento del movimiento de la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado

¿Cómo se trata la colecistitis?

Si su niño tiene colecistitis, probablemente necesitará permanecer en el hospital. Los tratamientos para la colecistitis pueden incluir:

- Antibióticos (si la vesícula biliar de su niño se ha infectado)
- Analgésicos para ayudarle a controlar el dolor de la vesícula biliar
- Líquidos por vía IV (un pequeño tubo que se pone en la vena) para evitar que su niño se deshidrate

Por lo general, los síntomas de su niño desaparecerán en 1 a 2 días. Sin embargo, a menudo la colecistitis se repite, por lo que el proveedor de atención médica de su niño le puede recomendar la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. A esto se le conoce como colecistectomía.

Por lo general, un cirujano puede extirpar la vesícula biliar de su niño a través de una cirugía mínimamente invasiva. Hará cuatro orificios pequeños en el abdomen de su niño e insertará una pequeña cámara de video que está unida a un pequeño tubo. Luego, utilizará instrumentos quirúrgicos para extirpar la vesícula biliar a través de uno de esos orificios.

Cuando su niño ya no tenga una vesícula biliar, la bilis fluirá desde el hígado hasta el intestino delgado en lugar de ser almacenada en la vesícula biliar. Su niño no necesita la vesícula biliar para la digestión.

¿Cómo puedo prevenir la colecistitis?

Evite que su niño contraiga colecistitis al:

- Hacer que coma una dieta rica en frutas, vegetales y fibra
- Ayudarlo a mantener (o lograr) un peso saludable
- Hacer que pierda peso lentamente (si así lo requiere)

Llame al proveedor de atención médica de su niño si este tiene:

- Dolor en la parte superior del abdomen que se pasa al hombro derecho o la espalda
- Náuseas
- Fiebre
- Vómitos
- Un abdomen doloroso al tocarlo



Notas

Cholecystitis: Gallbladder inflammation

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.