

# Edoxabán (Savaysa): *Lo que usted necesita saber y hacer*

## ¿Qué es edoxabán?

**Edoxabán (Savaysa)** es un **anticoagulante**. A veces, a los anticoagulantes se les conoce como “adelgazante de la sangre”. Ellos realmente no adelgazan la sangre. En su lugar:

- Detienen la acción de cierta proteína que el cuerpo necesita para coagular la sangre
- Detiene la formación de nuevos coágulos
- Evita que los coágulos sanguíneos se vuelvan más grandes, de tal manera que su cuerpo los pueda disolver con el tiempo

El edoxabán no puede deshacer los coágulos que usted ya tiene.

## ¿Por qué lo necesito?

Por lo general, el edoxabán se utiliza para:

- **Tratamiento de la fibrilación auricular.** La fibrilación auricular es un ritmo cardíaco anormal que puede causar la formación de coágulos sanguíneos en el corazón. Si los coágulos de sangre se mueven del corazón al cerebro, pueden causar un accidente cerebrovascular.
- **Tratamiento de la trombosis venosa profunda (DVT, por sus siglas en inglés) y la embolia pulmonar (PE, por sus siglas en inglés).** La DVT es un coágulo sanguíneo que se forma en la pierna. Puede liberarse y viajar a través del torrente sanguíneo hasta los pulmones donde puede bloquear una arteria. Cuando se bloquea una arteria pulmonar, a esto se le llama PE. El edoxabán puede prevenir la formación o crecimiento de coágulos y evitar que pedazos de estos se liberen mientras el cuerpo se está sanando.

## ¿Cuándo y cómo se debe tomar?

- Tome el edoxabán dos veces al día, con o sin alimentos.
- Tome el edoxabán aproximadamente a la misma hora cada día.
- No deje de tomar el edoxabán a menos que su proveedor de atención médica diga que está bien hacerlo.

## ¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si se le olvida tomar una dosis de edoxabán, pero recuerda tomarlo dentro de las 12 horas de cuando lo debe tomar normalmente, aún puede tomar la dosis. Sin embargo, si han pasado más de 12 horas desde el momento en que lo debe tomar, espere a la próxima dosis programada. **No tome ningún medicamento adicional para compensar la dosis que faltó.**

## ¿El edoxabán interactúa con otros medicamentos?

El edoxabán interactúa con algunos medicamentos. Estas interacciones pueden causar, ya sea un incremento en el sangrado, o la formación de un coágulo de sangre. Hable siempre con su proveedor de atención médica o farmacéutico antes de empezar a tomar un nuevo medicamento o suplemento. Los medicamentos que interactúan con el edoxabán incluyen:

- Aspirina y otros fármacos antiinflamatorios no esteroides (ibuprofeno, naproxeno, Motril, Advil, Aleve, etc.)
- Clopidogrel (Plavix)
- Fenitoína (Dilantin)
- Prasugrel (Effient)
- Rifampina
- Anticoagulantes (warfarina, Coumadin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis)
- Hierba de San Juan
- Venlafaxina (Effexor)
- Carbamazepina (Tegretol)
- Ticagrelor (Brillenta)

## ¿Presenta riesgos el edoxabán?

Al igual que todos los medicamentos, el edoxabán tiene algunos riesgos:

- **Puede incrementar su riesgo de sangrado.** Para obtener más información, consulte “**Cuándo debería recibir ayuda médica**”.
- **Puede causar sarpullido.** Si le aparece un sarpullido mientras está tomando edoxabán, infórmele a su proveedor de atención médica inmediatamente.



## ¿Cómo se compara el edoxabán con la warfarina (Coumadin)?

Los estudios demuestran que el edoxabán es tan eficaz como la warfarina para disminuir el riesgo de un accidente cerebrovascular a partir de la fibrilación auricular, y para tratar los coágulos de sangre. El edoxabán también puede tener un menor riesgo de sangrado que la warfarina.

- **Ventajas.** El edoxabán tiene menos interacciones medicamentosas que la warfarina, no interactúa con la comida y no requiere pruebas de sangre frecuentes.
- **Desventajas.** El edoxabán solo está disponible bajo el nombre de marca Savaysa. Puede ser más costoso porque no hay una opción genérica disponible. Tampoco hay un antídoto para revertir su efecto en caso de un sangrado grave.

**¿Es seguro durante el embarazo o la lactancia?** Las mujeres no deben tomar edoxabán durante el embarazo o mientras están amamantando. Si está embarazada o planea estarlo, hable con su médico antes de empezar a tomar edoxabán.

**¿Cómo guardo el edoxabán?** Guárdelo en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños.

## ¿Quién NO debe tomar edoxabán?

Las personas que son alérgicas al edoxabán o que tengan problemas de sangrado, una válvula cardíaca mecánica o una enfermedad valvular cardíaca significativa, o una función renal deficiente. Si usted tiene cualquiera de estas condiciones médicas y está tomando edoxabán, infórmele inmediatamente a su proveedor de atención médica.

## ¿Cómo puedo prevenir el sangrado?

Para reducir el riesgo de sangrado abundante:

- **Consulte a su médico antes de realizar actividades donde tenga un riesgo grave de lesiones, hematomas (moretones) o sangrado.** Algunos ejemplos son los deportes de contacto, deportes extremos o trabajo donde tiene que subir una escalera o cerca de herramientas afiladas.
- **Dígale a su médico o dentista que está tomando edoxabán por lo menos 1 semana (7 días) antes de someterse a un procedimiento dental o quirúrgico.**

## ¿Cuándo debería recibir ayuda médica?

### Llame a su médico o a la clínica de anticoagulación si:

- Usted inicia, termina o cambia la dosis de cualquiera de los medicamentos enunciados [en la página anterior](#)
- Se le ha dicho que sus riñones o hígado no funcionan bien
- Usted se cae y se hace daño, especialmente si se golpea la cabeza
- Usted observa un **incremento de cualquiera de estas señales de sangrado:**
  - Más hematomas de lo normal
  - Sangrado anormal por la boca, la nariz o las encías
  - Orina rosada, roja o marrón oscuro
  - Sangrado menor o sangre roja brillante en sus heces
  - Incremento en el sangrado menstrual

### Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Evacuación intestinal con sangre, roja oscura, negra o como alquitrán (pegajosa)
- Vómito que contiene sangre de color rojo brillante, que es negra o es marrón oscuro como café molido
- Nariz que sangra y que no deja de hacerlo después de aplicarle presión durante 20 minutos
- Mareo, desmayo o debilidad de aparición súbita
- Dolor súbito en una articulación
- Un dolor de cabeza muy fuerte o cuello rígido que aparece súbitamente
- Visión borrosa que aparece rápidamente
- Dificultad para hablar o para mover un lado del cuerpo, lo que incluye un lado de la cara
- Dolor súbito en el pecho

*Edoxaban (Savaysa): What you need to know and do*

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.

©2018 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Hay más información disponible en [intermountainhealthcare.org](http://intermountainhealthcare.org). Patient and Provider Publications F5560S-04/18 (Last reviewed - 01/18) (Spanish translation 04/18 by inWhatLanguage)