

# Laringoscopia directa

## ¿Qué es una laringoscopia directa?

Una **laringoscopia directa** es una manera de buscar y corregir un problema en la caja de la voz o **laringe**, o realizar una prueba. La laringe está situada en la parte superior de la **tráquea**.

## ¿Por qué necesito este procedimiento?

Su médico puede necesitar:

- Extirpar pólipos, quistes, nódulos, tumores o un objeto extraño
- Diagnosticar un crecimiento anormal
- Mejorar la calidad de su voz y reducir la ronquera después de una lesión en las cuerdas vocales

## ¿Cuáles son los riesgos?

Los riesgos comunes de laringoscopia directa incluyen:

- Dolor de garganta
- Náuseas y/o vómitos
- Entumecimiento temporal de la lengua
- Daño en el tejido blando de la garganta
- Reacción negativa a la anestesia
- Ronquera permanente o cambio en la calidad de la voz (poco frecuente)
- Daño en los dientes durante el procedimiento (muy poco frecuente)



## ¿Cuándo debo llamar a mi médico?

Llame a su médico si presenta algunos de estos síntomas:

- Problemas para respirar
- Dolor que empeora o no puede controlarse con analgésicos
- Pérdida de dientes o dientes fuera de lugar
- Hinchazón importante en la parte posterior de la garganta
- Tos con sangre de color rojo brillante
- Escalofríos o fiebre superior a 101 °F (38 °C)

## ¿Qué debo hacer para prepararme?

- **Proporcione al médico una lista de todos sus medicamentos.** Asegúrese de incluir medicamentos recetados, vitaminas, remedios a base de hierbas o cualquier medicamento sin receta que usted esté tomando (tales como pastillas para la alergia o jarabe para la tos).
- **Siga las instrucciones de su médico con respecto a sus medicamentos.** Algunos medicamentos pueden aumentar su riesgo de sangrado. Es probable que deba dejar de tomarlos durante algunos días antes del procedimiento.
- **Siga todas las instrucciones sobre cuándo dejar de comer y tomar líquidos antes de la cirugía.** Esto le ayudará a evitar complicaciones de la anestesia.
- **Haga los arreglos necesarios con un adulto responsable para que lo lleve a su casa después del procedimiento** y le brinde cuidados durante las primeras 24 horas (1 día) posteriores a la cirugía.

