

Uso de Cathflo en su vía intravenosa (IV)

Su enfermera ha determinado que su vía IV necesita Cathflo para mantenerla abierta y que funcione correctamente. Cathflo deberá permanecer en su vía IV (instilado) el tiempo suficiente para limpiar la vía. La enfermera determinará la cantidad de tiempo que permanece en su vía IV. No use el Cathflo hasta que la enfermera le diga dónde y cómo usarlo.

Quando usted recibe el Cathflo:

- Revise la etiqueta para verificar su nombre y la fecha de vencimiento. Si algo en la etiqueta no es correcto, llame a la enfermera o a la farmacia y no use el Cathflo.
- Guarde la jeringa de Cathflo en el refrigerador hasta que esté listo para usarla.

Una vez que la enfermera le enseñe cómo se usa Cathflo:

- 1 Quite la tapa del alcohol desinfectante del conector sin aguja y deséchela. **Si el conector sin aguja entra en contacto con algo, límpielo con un paño con alcohol durante 15 segundos antes de usarlo.**
- 2 Enjuague la vía intravenosa con suero y retire la jeringa. **Si no puede enjuagar la vía, no la fuerce.** Coloque la tapa del alcohol desinfectante y llame a su enfermera si necesita más instrucciones.
- 3 Conecte la jeringa con Cathflo a su conector sin aguja.
- 4 Lentamente inyecte 2 mililitros (mL) de Cathflo y luego retire la jeringa.
- 5 Coloque una tapa nueva al alcohol desinfectante.



- 6 Marque su vía con la etiqueta proporcionada.
- 7 Deje que Cathflo permanezca en la vía todo el tiempo que su enfermera le indique que debe permanecer ahí.
- 8 Llame a su enfermera para informarle los resultados.

Usted tiene Cathflo en su vía IV para ayudar a mantenerla limpia. **Antes de usar su vía IV para su medicamento, se debe quitar el Cathflo.** Espere que su enfermera le dé instrucciones sobre qué hacer con el Cathflo antes de intentar hacerlo usted mismo.

Cómo quitar el Cathflo:

- 1 Quite la etiqueta del Cathflo de su vía IV.
- 2 Quite la tapa del alcohol desinfectante y deséchela. **Si el conector sin aguja entra en contacto con algo, límpielo con un paño con alcohol durante 15 segundos antes de usarlo.**
- 3 Coloque una jeringa de 10 ml vacía y tire del émbolo.
 - **Si no ve ningún retorno sanguíneo:**
 - Quite y descarte la jeringa vacía y coloque una tapa nueva al alcohol desinfectante.
 - Llame a la enfermera para recibir instrucciones:
 - **Si ve retorno sanguíneo:**
 - Extraiga de 2 a 3 ml de sangre con la jeringa.
 - Quite y deseche la jeringa.
 - Enjuague su vía intravenosa con 20 ml de suero (2 jeringas de solución salina) y retire la jeringa.
 - Coloque una tapa nueva al alcohol desinfectante.
 - Llame a su enfermera para informarle los resultados.
 - Cuando sea la hora, puede darle su próxima dosis de medicamento excepto que su enfermera le indique lo contrario.



¿Necesita ayuda o tiene preguntas?

Enfermera: _____

Teléfono: _____

Intermountain Homecare & Hospice:

385-887-6000

800-527-1118



Contenido creado y aprobado por Intermountain Homecare & Hospice

Using Cathflo in Your IV Line

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.

©2018 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Hay más información disponible en intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications FSHC035S-09/18 (Last reviewed - 09/18) (Spanish translation 10/18 by inWhatLanguage)